سیویلیکا – ناشر تخصصی مقالات کنفرانس ها و ژورنال ها گواهی ثبت مقاله در سیویلیکا CIVILICA.com

## **عنوان مقاله:** تاثیر آگاهی مادران از روش های پیشگیری از پوسیدگی بر شاخص dmft در کودکان

محل انتشار: مجله علمی پژوهان, دوره 22, شماره 2 (سال: 1403)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

نویسندگان: رضا نمدکلاهی – Student Research Committee, School of Dentistry, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran

Faculty of Dentistry, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran - هليا حسن زاده

Department of Pediatric Dentistry, Dental Faculty, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran - سميه حكمت فر

## خلاصه مقاله:

سابقه و هدف: پوسیدگی دندان شیری بر کیفیت زندگی کودک تاثیر دارد و می تواند در فعالیت های روزانه و فرایند رشد کودک تداخل ایجاد کند. این بیماری تحت تاثیر عوامل مختلفی چون رژیم غذایی، بهداشت دهانی و عوامل اجتماعی و اقتصادی قرار می گیرد. با توجه به اهمیت آگاهی والدین از پیشگیری از پوسیدگی دندانی در کودکان، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط میان شاخص dmft و سطح آگاهی مادران طراحی شده است. مواد و روش ها: این مطالعه ی توصیفی تحلیلی درباره ک<sup>4</sup> ۲۹ مادر دارای کودک زیر ۷ سال انجام شد. پس از ثبت شاخص dmft، اطلاعات دموگرافیک کودکان و اسطح آگاهی مادران طراحی شده است. مواد و روش ها: این مطالعه ی توصیفی تحلیلی درباره ی ۴۳۲ مادر دارای کودک زیر ۷ سال انجام شد. پس از ثبت شاخص dmft، اطلاعات دموگرافیک کودکان و سطح آگاهی مادران با ۱۳سوال بر اساس توصیه های آکادمی دندان پزشکی کودکان آمریکا جهت پیشگیری از پوسیدگی ارزیابی شد. به منظور تحلیل داده ها، از آزمون کروسکال والیس و ضریب هم سطح آگاهی مادران با ۱۳سوال بر اساس توصیه های آکادمی دندان پزشکی کودکان آمریکا جهت پیشگیری از پوسیدگی ارزیابی شد. به منظور تحلیل داده ها، از آزمون کروسکال والیس و ضریب هم بستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها: نمره آگاهی برای مادران با فرزند پسر و دختر به ترتیب برابر با ۲۲/۲ ± ۲/۳۰ و ۲۳۵ ± ۲/۵ ۲/۵ ± ۲/۵۰ ± ۲/۵ ۲/۵ تعنی دار (۲۹۵۷-۱۹ ۲) به دست آمد. مادران با سرای کودکان آمریکا جهت پیشگیری از پوسیدگی دندان برای نه معید را داده بودند. رابطه ی متغیر آگاهی مادران با مادران با ماله معین برای با ۲/۱ ± ۲/۵۰ و ۲/۵۰ و ۲/۵۰ و تعلق معی دار (۲۹۵۷) به دست آمد. مادران با می معیر آگاهی مادران با فرزند پسر و دختر به ترتیب برابر با ۲/۱ ± ۲/۳۵ و ۲/۵۰ ± ۲/۵۰ و ۲/۵۰ ± ۲/۵۰ و ۲/۵۰ و ۲/۱ و مروش مادران با مودند. رابطه ی معنی دار نورد (۲/۵۰ ورش های یا تعرین با در دارا با فرزند پسر و دختر به ترتیب برایر با ۲/۵ ± ۲/۵۰ وردک (۲/۵۰ و در این باین محیح را داده بودند. رابطه ی معنی دار نور شاین مادران با فرزند پسر و معیری با معیر مادران با مردان با مردان با فرزند پسر و معرونه معرونه به مینیز خمیردندان برای کودکان تاشم مادران رابطه ی معیر را و موسیدگی دندانی کودکان نداشت؛ ولی آگاهی مادران از روش های همهر برای جلوگیری از شاعص مادر منور ماد می مورا ماد می باز کردر با بادرس مول می مودکان تاثیر بگذارد. آ

کلمات کلیدی:

Dental caries, Primary teeth, Oral health, Child, پوسیدگی؛ دندان شیری؛ بهداشت دهان؛ کودک

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

https://civilica.com/doc/2041417

