

عنوان مقاله:

ارتباط سبک دلبستگی با وابستگی متقابل در همسران بیماران مبتلا به مصرف مواد تحت درمان نگهدارنده

محل انتشار:

نشریه روان پرستاری، دوره 12، شماره 2 (سال: 1403)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

نویسندگان:

حمیده عظیمی لوتی - Mazandaran University of Medical Sciences

حجت الله ولی پور - Mazandaran University of Medical Sciences

یدالله جنتی - Mazandaran University of Medical Sciences

علی اصغر، نادى قرا - Mazandaran University of Medical Sciences

آذر رضانی - Mazandaran University of Medical Sciences

مریم رستم وند - Mazandaran University of Medical Sciences

خلاصه مقاله:

مقدمه: اعتیاد پدیده‌ای آسیب‌زننده به اقتصاد، سلامتی و بنیان خانواده‌ها می‌باشد. اعضای خانواده‌های فاقد روابط صمیمی والدین- فرزندان و پیوندهای ایمن تمایل به مصرف مواد بیشتری دارند. از پیامدهای زندگی با افراد معتاد، وابستگی متقابل همسران می‌باشد. این مطالعه با هدف تعیین رابطه سبک دلبستگی و وابستگی متقابل همسران بیماران مبتلا به مصرف مواد تحت درمان نگهدارنده طراحی گردید. روش کار: این مطالعه توصیفی همبستگی در سال ۱۴۰۰ روی ۹۸ نفر از همسران بیماران مبتلا به مصرف مواد تحت درمان نگهدارنده مراجعه کننده به درمانگاه ترک اعتیاد بیمارستان روان پزشکی زارع ساری به صورت تصادفی ساده، انجام شد. ابزارهای مورد استفاده مقیاس دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید و پرسشنامه وابستگی متقابل اسپن و فیشر بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار $spss-22$ و روش‌های آماری توصیفی و استنباطی (کای اسکور، t مستقل، من ویننی، آنالیز واریانس، کروسکال والیس و رگرسیون خطی) استفاده گردید. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد میانگین و انحراف معیار سبک دلبستگی ایمن $11/88 \pm 2/21$ ، نالینم $12/11 \pm 2/60$ ، دوسویه همسران بیماران مبتلا به مصرف مواد $11/71 \pm 4/50$ و وابستگی متقابل $60/65 \pm 12/00$ بود. نتایج ضریب همبستگی جزئی نشان داد بین وابستگی متقابل با دلبستگی نالینم همبستگی منفی ($P < 0.05$ $r = 0.22$) و بین وابستگی متقابل با دلبستگی دوسویه-اضطرابی همبستگی مثبت وجود داشت ($P < 0.05$ $r = 0.496$). نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد برای پیش بینی وابستگی متقابل از سبک‌های دلبستگی تنها سبک دلبستگی دوسویه-اضطرابی به طور معنی‌داری می‌تواند ۳۱ درصد تغییرات وابستگی متقابل همسران بیماران معتاد تحت درمان نگهدارنده را پیش‌بینی کند و همچنین وابستگی متقابل در همسران بیماران مبتلا به مصرف مواد با مدت زمان مصرف مواد، رتبه تولد و تجربه وقایع فشارزا در ۶ ماه اخیر ارتباط معنی‌داری داشت. نتیجه‌گیری: وابستگی متقابل با سبک دلبستگی ارتباط معنی‌داری داشت و باید همراه با بیماران معتاد به همسران آنان و به ویژه همسرانی که دلبستگی دوسویه اضطرابی دارند به منظور پیشگیری از وابستگی متقابل توجه بیشتری نمود. توصیه می‌شود برای تحقیقات آتی، با عنایت به ریشه‌های فرهنگی تاریخی جامعه ایرانی، پژوهش حاضر در شهرهای دیگر هم انجام گردد تا اثر تفاوت‌های فرهنگی خانواده‌ها هم مورد بررسی قرار گیرد.

کلمات کلیدی:

Attachment styles, Interdependence, Spouses, Drug use, Maintenance therapy

دلبستگی، وابستگی متقابل، همسران، سوء مصرف مواد مخدر، درمان نگهدارنده.

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/2057516>



