

## عنوان مقاله:

اثرات ترک سیگار در کاهش شدت اختلالات نعوظی در افراد سیگاری

## محل انتشار:

دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی (سال: 1384)

تعداد صفحات اصل مقاله: 47

## نویسندگان:

غلامرضا پورمند

محمدرضا عالی داعی - پزشک عمومی

صادق رسولی - پزشک عمومی

آمنه ملکی - پزشک عمومی

## خلاصه مقاله:

درصد قابل توجهی از مردان جامعه، سیگاری هستند و اکثراً استعمال سیگار را از سنین پایین آغاز می نمایند. ترکیبات دود سیگار با مکانیسمهای مختلف سبب آسیب به اندوتلیوم عروق و اختلال در دیلاتاسیون عروق و نهایتاً اترواسکلروز می شود. نعوظ، فرایند عصبی-عروقی پیچیده است که اتساع عروقی وابسته به اندوتلیوم در آن نقش کلیدی دارد. بر همین اساس نقش سیگار در اختلالات نعوظی در مقالات متعددی مطرح شده است ولی در زمینه میزان بازگشت پذیری اختلالات نعوظی پس از ترک سیگار مطالعات بسیار کمی وجود دارد. با توجه به اهمیت بسیار اختلالات نعوظی برای بیماران، در صورت اثبات برگشت پذیری اختلالات نعوظی وابسته به سیگار پس از ترک، نه تنها هشدار لازم به در این راستا به افراد سیگاری مبتلا به اختلالات نعوظی داده می شود، انگیزه لازم جهت ترک در آنها ایجاد خواهد شد. هدف: ارزیابی اینکه آیا قطع سیگار، اختلال نعوظ در سیگاریها را بهبود می دهد. چراکه سیگار کشیدن یک عامل خطر شناخته شده برای ED می باشد.

## کلمات کلیدی:

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/212435>

