

عنوان مقاله:

استفاده از روش اگرواکولوژی و ارزیابی تناسب اراضی در مشخص نمودن مدیریت مزارع یونجه در دشت ارومیه

محل انتشار:

دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست (سال: 1392)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

نویسندگان:

نادر فائمیان

حسین تابیه زاد

فرخ غنی شایسته

خلاصه مقاله:

اراضی دشت ارومیه پتانسیل تولید حدود 4/7 تن درهکتار را دارا می باشند . برای محاسبه پتانسیل تولید از روش اگرواکولوژیکی فائواستفاده می شود و در مرحله بعدی کلاس تناسب اراضی تعیین می گردد . سپس مقدار تولید واقعی هر کلاس تعیین می گردد و با مقادیر پتانسیل سنجیده می شود. از طرفی مدیریت مزرعه به سه سطح خوب ، متوسط وضعیف تقسیم می گردد اگر میزان تولید واقعی دریک کلاس بیشتر از میزان تولید موردانتظار باشد مدیریت مزرعه عالی وچنانچه این میزان درحد تولیدکلاس موردنظر باشد مدیریت متوسط ارزیابی می گردد. این تحقیق در مساحتی حدود 900 هکتار از اراضی جنوب دشت ارومیه که شامل چهارسری خاک می باشد انجام گرفته وسطوح مدیریت ارزیابی گردیده است.

کلمات کلیدی:

ارومیه، تناسب اراضی، مدیریت اراضی، یونجه

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/245785>

