

عنوان مقاله:

تأثیر مدت زمان اسانس گیری بر بازده اسانس گیاه دارویی *Ziziphora clinopodioides*

محل انتشار:

اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور (سال: 1392)

تعداد صفحات اصل مقاله: 3

نویسنده:

علی میرحسینی - کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد

خلاصه مقاله:

کاکوتی یکی از گیاهان مهم و اسانس دار از خانواده Labiateae با نام علمی *Ziziphora clinopodioides* می باشد. به منظور بررسی میت اسانس این گیاه، سرشاخه های گلدار این گونه در زمان گلدهی از رویشگاه طبیعی در استان یزد جمع آوری گردید. نکته مهم قابل توجه در پوشش گیاهی گونه مذکور در منطقه بدین صورت بود که در اواخر خرداد تا اوایل تیر به مرور وارد مرحله گلدهی می شود و مدتی طولانی حدود دو ماه از اوایل تی تا اواخر مردا دارای گل می باشد که این ویژگی در گیاهان دیگر منطقه کمتر دیده شد. در ا دامه با شناسایی و تأیید در بخش هرباریوم گیاهی، نمونه جمع آوری شده در شرایط مطلوب نگهداری و خشک گردید. سرشاخه گلدار خشک، آسیاب و به روش تقطیر با آب در زمانهای 1، 2، 3 و 4 ساعت اسانس گیری انجام شد. با ا تمام آزمایشات و بررسی نتایج مشخص گردید براساس زمان ا سانس گیری به ترتیب 0/806، 0/746، 1/02 و 0/84 گرم به ازای 100 گرم ماده خشک، اسانس به دست آمده است. از جمله خواص مهم دارویی این گونه برای تقویت معده، دفع درد و ناراحتی های معده کاربرد بسزایی دارد.

کلمات کلیدی:

گیاه دارویی، زمان اسانس، کاکوتی، استان یزد

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/247202>

