

عنوان مقاله:

بررسی فلورستیک گیاهی دو جزیره دریاچه سد گتوند

محل انتشار:

اولین همایش ملی محیط زیست (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

نویسندگان:

بهروز بهروزی راد - هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

شیدا مهری بابادی - دانشجوی کارشناسی ارشد زیستگاه ها و تنوع زیستی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

خلاصه مقاله:

بررسی فلورستیک گیاهی دو جزیره دریاچه سد گتوند با روش پلات گذاری در فصل بهار سال 1393 (از اواخر اسفند ماه 1392 تا اردیبهشت ماه 1393) انجام شد. در این بررسی 20 گونه در جزیره اول و 15 گونه گیاهی در جزیره دوم شناسایی گردید. گونه های *Stipa capensis* و *Plantago ovate* در جزیره اول غالب و در جزیره دوم گونه های *Stipa capensis* و *Lium strictum* جوامع عمده گیاهی را تشکیل داده بودند. این گونه ها در دامنه های شمالی متراکم تر و متنوع تر از دامنه های جنوبی بودند. در این بررسی تنوع شانون واینر در جزیره اول 1.34 درصد و در جزیره دوم 1.49 درصد، مارگالف در جزیره اول 1.93 درصد و در جزیره دوم 2.37 درصد، مهنیک در جزیره اول 0.48 درصد و در جزیره دوم 0/42 دصد، سیمپسون در جزیره اول 0/63 درصد و در جزیره دوم 0/68 درصد بدست آمد.

کلمات کلیدی:

فلورگیاهی، جزایر سدگتوند، تراکم، تنوع

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/279379>

