

عنوان مقاله:

تاثیر جیره های تنظیم شده بر اساس احتیاجات NRC و سنتی بر عملکرد بره های نژاد شال و آمیخته شال و سنجابی

محل انتشار:

همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی (سال: 1392)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

نویسندگان:

ن یآوری

ا لواف

ن ایلا

خلاصه مقاله:

هدف از این مطالعه ، بررسی تاثیر دو نوع مدیریت تغذیه (علمی و سنتی) بر روی 12 راس بره نر از دو نژاد شال و آمیخته شال و سنجابی در دو تیمار مورد آزمایش قرار گرفت . در تیمار NRC4 تکرار و در هر تکرار 2 راس بره نر و در تیمار سنتی ، 2 تکرار و در هر تکرار 2 راس بره نر در محدوده سنی 7 ماهگی در قالب طرح تصادفی ناقص مورد تحقیق قرار گرفتند طول دوره پروار 90 روز بود و جیره غذایی مورد استفاده در تیمار NRC در تغذیه علمی از استاندارد NRC1985 استفاده شد . خوراک های مصرفی در جیره غذایی در روش NRC شامل : سیلوی ذرت، گندم، کاه جو، کرینات کلسیم و کنجاله سویا و در جیره سنتی شامل : سیلوی ذرت و گندم بود که در طی سه وعده غذایی در شبانه روز در اختیار بره ها قرار داده می شد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که بره های تغذیه شده با جیره های علمی و سنتی از نظر افزایش وزن روزانه دارای اختلاف معنی داری بودند $P < 0/05$ به طوری که میانگین افزایش وزن بره ها در تیمار NRC و سنتی در کل دوره به ترتیب 115/3 و 89/8 گرم در هر روز بود. همچنین بالاترین افزایش وزن نهایی بدست آمده در کل دوره 11200 گرم مربوط به نژاد شال در جیره NRC و کمترین آن 7900 گرم مربوط به نژاد آمیخته شال و سنجابی در جیره سنتی بود. سود متغیر نیز به ازای یک راس بره (ریال) برای تیمار های NRC و شاهد به ترتیب 417633.2 و 352520.4 ریال بود

کلمات کلیدی:

تغذیه بره ، مقایسه اقتصادی ، روش سنتی و NRC

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/290921>

