

عنوان مقاله:

مطالعه فنولوژی دو گونه مرتعی *Astragalus cyclophyllon* و *Bromus tomentellus* Boiss
Beck به منظور تعیین بهترین زمان چرای دام مطالعه موردی: ایستگاه سدزاینده رود

محل انتشار:

دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

اکرم کریمیان شلمزاری - دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه شهرکرد

مصطفی سعید فر - استادیار گروه مرتعداری و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان اصفهان

عطاالله ابراهیمی - استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه شهرکرد

پژمان طهماسبی - استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه شهرکرد

خلاصه مقاله:

فنولوژی 2 گونه مرتعی *Astragalus cyclophyllon* و *Bromus tomentellus* Boiss ، در ایستگاه تحقیقاتی سدزاینده رود طی سالهای 1392-91 مورد بررسی قرار گرفت از مراحل مهم فنولوژی از جمله شروع رویش و رشد رویشی گلدهی، شیری شدن و بلوغ بذور و بذرپاشی بذر ظهور پژمردگی یادداشت برداری انجام گرفت نتایج نشان داد که مراحل فنولوژی در دو گونه متفاوت فرق میکند و وقوع هر مرحله ی فنولوژی تابع دما می باشد نتایج این تحقیق ضمن شناخت و معرفی پدیده های مهم فنولوژی میتواند مدیران مرتع را در تنظیم تقویم زمانی ورود و خروج دام به مرتع یاری نماید

کلمات کلیدی:

فنولوژی ، رشد رویشی ، گلدهی ، *Astragalus* ، *Bromus tomentellus* Boiss ، سدزاینده رود ، *cyclophyllon* Beck

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/309737>

