

عنوان مقاله:

اثرات استفاده از سطوح مختلف دانه زیره سبز بر عملکرد بلدرچین ژاپنی

محل انتشار:

دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

معصومه کریمی راد - کارشناس ارشد پرورش و تولید طیور دانشگاه بیرجند

نظر افضلی - استاد دانشگاه بیرجند

محمود قزافی - عضو هیئت علمی دانشگاه زابل

حسین نعیمی پوریونسی - عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند

خلاصه مقاله:

این آزمایش به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف زیره سبز بر عملکرد بلدرچین تخمگذار ژاپنی انجام گرفت. آزمایش در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با تعداد 288 قطعه بلدرچین ژاپنی تخمگذار نژاد سفید انگلیسی در 6 تیمار شامل شش سطح جیره های حاوی صفر بدون زیره سبز/5 و 1/5 و 2/5 و درصد زیره سبز با 4 تکرار و 12 قطعه بلدرچین در هر تکرار به مدت 8 هفته از سن 7 تا 15 هفتگی بلدرچین انجام گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که سطوح مختلف زیره سبز تأثیر معنی داری بر عملکرد بلدرچین ها نداشت ($p > 0/05$)

کلمات کلیدی:

بلدرچین ژاپنی، زیره سبز، عملکرد

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/310013>

