

عنوان مقاله:

تعیین قابلیت هضم غلاف خارجی بادام به منظور استفاده از آن در تغذیه گوسفند

محل انتشار:

همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی (سال: 1392)

تعداد صفحات اصل مقاله: 5

نویسنده:

غلامرضا شادنوش - استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری شهرکرد

خلاصه مقاله:

در این تحقیق قابلیت هضم آزمایشگاهی و قابلیت هضم ظاهری غلاف خارجی سه رقم بادام پوست کاغذی، مامایو سنگی در استان چهارمحال و بختیاری در دو سال متوالی تعیین گردید. میانگین کل قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده خشک، ماده آلی و ماده آلی در ماده خشک غلاف بادام به ترتیب 67/7، 65/3 و 58/8 درصد و میانگین قابلیت هضم ظاهری ماده خشک، پروتئین خام، انرژی خام، ADF، NDF و خاکستر آن به ترتیب 74/35، 33/45، 72/95، 49/15، 34/1 و 47/11 درصد بود. قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده خشک، ماده آلی و ماده آلی در ماده خشک ارقام مختلف بادام یکسان بود ($P>0/05$). قابلیت هضم ظاهری ماده خشک، انرژی خام و NDF در مخلوط غلاف بادام بالاتر ($P<0/05$) از یونجه، ولی قابلیت هضم ظاهری پروتئین و چربی خام یونجه بیشتر ($P<0/05$) از مخلوط غلاف بادام و برای ADF و خاکستر تفاوتی مشاهده نشد ($P>0/05$).

کلمات کلیدی:

غلاف خارجی بادام، قابلیت هضم آزمایشگاهی، قابلیت هضم ظاهری

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/323807>

