

## عنوان مقاله:

بررسی اثرات سطوح مختلف پودر دارچین بر عملکرد رشد و تلفات جوجه های گوشتی

## محل انتشار:

اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

## نویسندگان:

ابوب نیک گو - دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه طیور دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

مرتضی مهری - عضو هیئت علمی گروه دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

مختار فتحی - استادیار گروه علوم دامی- بخش کشاورزی، دانشگاه پیام نور

## خلاصه مقاله:

این آزمایش به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پودر دارچین بر عملکرد رشد و تلفات جوجه های گوشتی سوبه راس 308 انجام شد. در این آزمایش دویست و چهل جوجه گوشتی یک روزه در قالب یک طرح کاملاً تصادفی بین 3 گروه تیماری تقسیم شدند. هر تیمار دارای 4 تکرار و هر تکرار شامل 20 جوجه بود. 3 تیمار آزمایشی ع بارت بودند از 1- تیمار (Control) که از یک جیره غذایی پایه تغذیه کرد 2- تیمار (0/1 درصد)، که سطح 0/1 درصد پودر دارچین در کیلوگرم خوراک، را همراه با جیره پایه مصرف کرد 3- تیمار (0/2 درصد)، که سطح 0/2 درصد پودر دارچین در کیلوگرم خوراک، را همراه با جیره پایه مصرف کرد. نتایج عملکرد نشان داد که، م کامل سازی دارچین (0/1 و 0/2 درصد) سبب افزایش معنی دار وزن بدن شد ( $P < 0/05$ ). همچنین سبب کاهش معنی دار خوراک مصرفی و ضریب تبدیل در دوره آغازین گردید. سطوح دارچین در دوره های رشد و پایانی و کل سبب افزایش معنی دار خوراک مصرفی شد ( $P < 0/05$ ) اما در این دوره ها تأثیر معنی داری بر ضریب تبدیل خوراک نداشت ( $P > 0/05$ ). همچنین سطوح دارچین سبب کاهش تلفات نسبت به گروه شاهد گردید و هیچ تلفاتی در تیمارهای حاوی دارچین مشاهده نشد ( $P < 0/05$ ).

## کلمات کلیدی:

دارچیه، عملکرد رشد، تلفات، جوجه های گوشتی

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/329877>

