

عنوان مقاله:

بررسی شیوع سنگ کیسه صفرا در بیماران بستری شده در بیمارستان های شهرستان شهرکرد در سال 1389

محل انتشار:

اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 5

نویسندگان:

نرگس امینی فرد - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزادشهرکرد

مهدی دیانی نیا - دانشجوی دکترای تخصصی فیزیولوژی دانشگاه آزادشهرکرد

خلاصه مقاله:

زمینه و هدف: از اختلالات شایع در مورد کیسه صفرا تشکیل سنگ می باشد. این سنگ ها در کودکان و بالغین جوان به ندرت دیده می شوند ولی با افزایش سن شیوع آن به تدریج افزایش می یابد. این بیماری در زنان شایع تر از مردان است بطوریکه برخی از مطالعات نشان داده اند 20 % زنان و 8 % مردان در ایالات متحده به این بیماری مبتلا هستند (8). بر طبق تحقیقات انجام شده قبلی بین ابتلا به سنگ کیسه صفرا و جنسیت و سن ارتباط وجود دارد بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان ارتباط میان سن و جنس و تعداد و اندازه سنگ در بیماران مبتلا به سنگ کیسه صفرا انجام شد. روش بررسی: در این بررسی تعداد 200 پرونده پزشکی به طور تصادفی انتخاب شد. نتایج بررسی به وسیله پرسشنامه هایی که بر مبنای سن، جنس، تعداد و اندازه سنگ تهیه شده بود گردآوری گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها و نتیجه گیری: میانگین سنی بیماران مورد بررسی 51 سال بود. در بین 200 بیمار بررسی شده از لحاظ شیوع جنسی 153 نفر زن (76.5 %) بوده اند و 47 نفر مرد (23.5 %) می باشند. در کیسه صفرای 36 (18 %) بیمار تنها یک سنگ کمتر از 1cm و در کیسه صفرای 164 (82 %) بیمار سنگ های متعددی گزارش شد. که در این میان سنگ هایی با اندازه 15-17 بیشترین شیوع را داشته اند. بر اساس نتایج به دست آمده در این پژوهش سنگ های صفراوی در زنان بیش از مردان شیوع دارد و احتمال تشکیل سنگ های متعدد در کیسه صفرا بیش از یک سنگ می باشد. سنگ هایی با اندازه متوسط بیشترین میزان شیوع را در زنان و مردان دارد. احتمال تشکیل سنگ های صفراوی در زنان در سنین میان سالی و در مردان در کهن سالی بیشتر است.

کلمات کلیدی:

سنگ کیسه صفرا، کوله سیستکتومی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/333512>

