

عنوان مقاله:

استعمال دخانیات در جمعیت 15-64 ساله مناطق شهری و روستایی

محل انتشار:

چهارمین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

نویسندگان:

اکرم احمدی زاده - کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

عمادالدین رفیعی زاد - دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

محمدکریم دشتیان - کارشناس بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

الهام احمدی زاده فینی - کارشناس ارشد آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

خلاصه مقاله:

استعمال دخانیات یکی از مشکلاتی است که جهان امروز با آن مواجه است و سلامت آنها را تهدید میکند. امروزه جامعه بشری بیش از هر زمان دیگری آلوده به مصرف دخانیات است. توتون، تنباکو در مقیاس بسیار وسیع به کشتار انسانها مشغول می باشند به طوری که در هر 10 ثانیه یک انسان در اثر عوارض و بیماریهای ناشی از دخانیات جان می سپارد. مواد و روشها: مطالعه حاضر مطالعه توصیفی تحلیلی گذشته نگر و از نوع مطالعات ثانویه بود که بر اساس پروتوکل سازمان جهانی بهداشت و با استفاده از داده های نظام مراقبت عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر در استان هرمزگان انجام شده است. داده ها پس از کدگذاری به نرم افزار آماری SPSS 16 وارد شدند و با استفاده از آمار توصیفی نظیر جدولهای فراوانی و نمودارها، توصیفی از وضعیت شاخص های دموگرافیک و متغیرهای تحقیق ارائه گردید، سپس جهت بررسی فرضیه های تحقیق از آزمونهای من - ویتنی، کروسکال والیس و جدول توافق (کای دو) استفاده شد. نتایج: نتایج این مطالعه نشان داد که بطور کلی 11/1 درصد از افراد مورد مطالعه مصرف کننده روزانه سیگار بودند و این میزان در مناطق شهری 8/13 درصد و در مناطق روستایی 1/10 درصد، در گروه مردان 6/21 درصد و در زنان 0/4 درصد و بیشترین گروه سنی 35-44 و 45-54 سال می باشد. استعمال روزانه قلیان هم 5/13 درصد از افراد مورد مطالعه را تشکیل میدهد که در مناطق شهری این میزان 3/5 درصد و در مناطق روستایی 4/17 درصد و در مردان 2/9 درصد و در گروه زنان 8/17 درصد بطوریکه در گروه زنان روستایی تقریباً دو برابر مردان می باشد. بیشترین گروه سنی مصرف کننده قلیان هم رده های سنی 45-54 و 54-64 سال بودند. بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که بطور کلی استعمال روزانه قلیان 5/13 درصد و سیگار 11/1 درصد بوده است و با توجه به اینکه متأسفانه استعمال قلیان بر خلاف سیگار و در گروه زنان و مناطق روستایی استان بیشتر است، تدوین و اجرای برنامه های آموزشی در خصوص مضرات استعمال دخانیات بویژه قلیان و تاثیر عوارض سوء دود محیطی آن برای افرادی که مصرف کننده نیستند اما در معرض دود تحمیلی آن قرار دارند ضروری بنظر می رسد و پیشنهاد می گردد در برنامه های عملیاتی کنترل و پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر در استان لحاظ گردد.

کلمات کلیدی:

دخانیات، جمعیت، هرمزگان

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/363510>



