

عنوان مقاله:

مقایسه ی اجزای گل 12 ژنوتیپ گل محمدی (Rosa damascene mill) در شهرستان سنندج

محل انتشار:

سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار (سال: 1394)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

نویسندگان:

ارسلان فداکار - دانشجوی کارشناسی ارشد تولیدات گیاهی، دانشگاه لرستان

بهمن زاهدی - استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه لرستان

بایزدی یوسفی - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی کردستان

خلاصه مقاله:

این آزمایش به منظور بررسی سازگاری ژنوتیپ های گل محمدی استان کردستان از نظر اجزای گل اجرا گردید. در این آزمایش، 12 ژنوتیپ گل محمدی جمع آوری شده از نقاط مختلف استان کردستان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در ایستگاه تحقیقاتی زاله سنندج کشت شدند. صفاتی از قبیل میانگین قطر گل، متوسط وزن تر گل و متوسط وزن خشک گل مورد بررسی قرار گرفت. و در طی دوره گل دهی یادداشت برداری شد. تجزیه واریانس صفات مورد بررسی، تفاوت معنی داری را بین ژنوتیپ ها برای کلیه صفات نشان داد. ژنوتیپ کردستان 2 بیشترین قطر گل و ژنوتیپ کردستان 7 کمترین قطر گل، ژنوتیپ کردستان 4 بیشترین وزن تر گل و ژنوتیپ کردستان 3 کمترین وزن تر گل، ژنوتیپ کردستان 4 بیشترین وزن خشک گل و ژنوتیپ کردستان 3 کمترین وزن خشک گل را نشان دادند.

کلمات کلیدی:

گل محمدی (Rosa damascene mill)، سنندج، اجزای گل، 12 ژنوتیپ

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/416503>

