

عنوان مقاله:

تومور تروفوبلاست حاملگی از نوع کم خطر: برخورد مناسب و پیگیری بیماران

محل انتشار:

چهارمین کنگره سراسری سرطان های زنان ایران (سال: 1391)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

نویسنده:

مژگان کریمی زارچی - فلوشیپ اونکولوژی زنان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

خلاصه مقاله:

تومور تروفوبلاست حاملگی از نوع بدخیم زمانی تشخیص داده می شود که مشخصات پاتولوژی، آزمایشگاهی، کلینیکی و یا پاراکلینیک بیمار دلالت بر این عارضه داشته باشد و معمولا بدنبال حاملگی مولار ایجاد می شود. اما این نوع بدخیمی می تواند بدنبال تمام انواع حاملگی ها بروز کند. در ابتدای امر بررسی تمام محل های شایع متاستاز ضرورت دارد و پس از اسکورینگ و مرحله بندی در صورتی که در مرحله 1 و یا در مرحله 2 و 3 کوخطر قرار گیرد می توان از رژیم های تک دارویی و بخصوص متوترنکسات کمک گرفت. این رژیم در 90% مرحله 1 و 80% مرحله 2 و 3 کم خطر پاسخ به درمان خواهد داد و پاسخ به درمان به معنی نرمال ماندن آزمایش حاملگی به مدت 14-21 روز است. طبق مطالعه 2004 که توسط انجمن امریکایی زنان-مامائی ارائه شده رژیم متوترنکسات هفتگی ارجح است و بهتر از روش 8 روزه تحمل می شود ولی مطالعات در این زمینه ادامه دارد.

کلمات کلیدی:

تومور تروفوبلاستی حاملگی، نوع کم خطر، برخورد صحیح، پیگیری

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/421289>

