

عنوان مقاله:

بررسی رابطه کفایت دیالیز با دز اریتروپوئیتین مکمل تجویز شده در بیماران همودیالیزی

محل انتشار:

فصلنامه دانش و تندرستی، دوره 3، شماره 2 (سال: 1387)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

حسین ابراهیمی - دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه پرستاری

احمد خسروی - دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

ناهید بلبل حقیقی - دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه مامایی

خلاصه مقاله:

مقدمه: این تحقیق باهدف تعیین رابطه کفایت دیالیز با دز اریتروپوئیتین مکمل تجویز شده در بیماران تحت درمان با همودیالیز شهرستان شاهرود انجام شده است. مواد و روش ها: نمونه های پژوهش شامل 54 بیمار تحت درمان با همودیالیز در شهرستان شاهرود بودند. معیار ورود نمونه شامل درمان با همودیالیز به مدت 6 ماه، درمان با اریتروپوئیتین زیر جلدی حداقل برای 4 ماه، فریتین پلاسما بیش تر از 100 نانوگرم درمیلی لیتر و هماتوکریت هدف 30% برای مدت 3 ماه بود. برای بررسی کفایت دیالیز انجام شده ضریب Kt/V برای بیماران محاسبه شده است. نتایج: در این مطالعه 30 نفر (6/55%) بیماران مذکر و 24 نفر (4/44%) مونث بودند 70/4% بیماران (38 نفر) دارای ضریب Kt/V کم تر از 1/2 و 29/6% (16 نفر) دارای ضریب Kt/V بسش تر از 1/2 بودند. آزمون آماری t مستقل نشان دهنده عدم وجود اختلاف معنادار بین میزان آهن، فریتین، هموگلوبین و هماتوکریت در بیماران با Kt/V کمتر و بیش تر از 1/2 بود. اما بین میزان تزریق اریتروپوئیتین و ضریب Kt/V ارتباط معناداری مشاهده گردید، به طوری که میانگین تزریق ماهانه اریتروپوئیتین در بیماران با 1/2

کلمات کلیدی:

ضریب V ، Kt ، اریتروپوئیتین، همودیالیز

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/443801>

