

عنوان مقاله:

تنوع پوشش گیاهی پیرامون خشکهدارهای افتاده راش با کلاسه قطری 80 - 40 سانتی متر در جنگل گرازین، نوشهر

محل انتشار:

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست (سال: 1394)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

زینب خوش صفا - فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

وحید اعتماد - استادیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

به منظور بررسی تاثیر خشکهدارهای افتاده راش با کلاسه قطری 80 - 40 روی پوشش گیاهی پیرامون آن تحقیق حاضر در بخش گرازین واقع در جنگل خیرود استان مازندران انجام شد. پوشش گیاهی در پیرامون خشکه دارهای افتاده با پلاتهایی به شکل مستطیل به عرض چهار مترادو متر از طرفین خشکهدار (و به طول خشکهدار شناسایی و ثبت شد. پوشش گیاهی در زیر تاج پوشش درختان راش نیز شناسایی و ثبت شد و به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. غنای گونه‌های مارگالف تنوع گونه‌های سیمپسون و یکنواختی پیت برای پوشش گیاهی میاسبه شد. نتایج نشان داد که غنای گونه‌های و تنوع در پیرامون خشکهدارهای افتاده به طور معنی‌داری (سطح 5%) بیشتر از درختان شاهد میباشد در حالی که از نظر یکنواختی تفاوتی مشاهده نشد. خشکهدارهای افتاده به دلیل ایجاد شرایط مطلوب و زیستگاه برای گونه‌های گیاهی موجب افزایش تنوع در اینگونه جنگلهای پهنبرگ میشوند

کلمات کلیدی:

تنوع گیاهی، خشکهدار افتاده، راش، گرازین

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/457805>

