

عنوان مقاله:

مقایسه استرس ادراک شده و تحمل ناکامی بین بیماران فشار خونی و افراد عادی شهر اهواز

محل انتشار:

کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی (سال: 1394)

تعداد صفحات اصل مقاله: 12

نویسندگان:

شاپور علی پور اندکا - دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

علیرضا حیدری - دانشیار، عضو هیئت علمی گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

خلاصه مقاله:

هدف از پژوهش حاضر مقایسه استرس ادراک شده و تحمل ناکامی بین بیماران فشار خونی و افراد عادی شهر اهواز بود به همین منظور از کلیه بیماران فشار خونی مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اهواز که در طول یک ترم به تعداد نفر، نفر بیماران مبتلا به طور فشاری خون و نفر افراد عادی شهر اهواز در سال بودند با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. طرح پژوهش از نوع علی - مقایسه ای بود و ابزارهای پژوهش عبارت بودند از مقیاس رویدادهای زندگی پیکل و مقیاس تحمل ناکامی هارینگتون استرس ادراک شده و همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیره در سطح/ استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دادند که استرس اخراج شده و تحمل ناکامی در گروه های مورد مطالعه دارای تفاوت معناداری می باشند. همچنین بر اساس نتایج این پژوهش، می توان استرس ادراک شده را به عنوان نوعی عامل در تحمل ناکامی در فشار خون و همچنین نحوه استفاده از راهکارهای مقابله با آن را مؤثر دانست.

کلمات کلیدی:

فشار خون، استرس ادراک شده، راهبردهای مقابله ای، تحمل ناکامی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/485916>

