

عنوان مقاله:

سندرم پای بی قرار در بیماران وابسته به آمفتامین تحت درمان ترک در یک مطالعه طولی

محل انتشار:

دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی (سال: 1394)

تعداد صفحات اصل مقاله: 15

نویسندگان:

لیلا گنابادی نژاد - دانشگاه علوم پزشکی ایران، گروه روانپزشکی، تهران، ایران

حمیدرضا احمدخانیها - دانشگاه علوم پزشکی ایران، انستیتو روانپزشکی تهران، تهران، ایران

حمیده موسوی سعادت آبادی - دانشگاه علوم پزشکی ایران، گروه روانپزشکی، تهران، ایران

لادن فتاح مقدم - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

خلاصه مقاله:

مقدمه: دوپامین یکی از نوروترانسمیترهای موثر در پاتوفیزیولوژی سوء مصرف مواد است. از جمله علل ذکر شده برای سندرم پای بیقرار نیز اختلالات در کارکرد دوپامین است به همین منظور در این مطالعه سعی شد تا رابطه میان سندرم پای بیقرار با عود سوء مصرف آمفتامین بررسی گردد. روش اجرا: این مطالعه یک مطالعه توصیفی تحلیلی طولی است. دو گروه مورد شامل بیماران وابسته به متامفتامین تحت درمان ترک با فراوانی 170 نفر که در طی درمان 100 نفر (58/8%) دچار عود سوء مصرف مواد شده و 70 نفر (41/2%) عود سوء مصرف نداشته اند و گروه کنترل با فراوانی 190 نفر که هیچ وابستگی مادی نداشتند انجام گرفت. نتایج نشان داد که شدت سندرم RLS در ماه دوم درمان، مهمترین تاثیر را بر عود داشته به طوری که شانس برگشت بیمار به سوء مصرف مواد را 35/19 برابر افزایش می دهد (P-Value=0/000) شدت سندرم پای بیقرار در گروه مورد در بدو ورود به مطالعه خفیف بوده که در طی درمان در ماه اول و دوم بر شدت این سندرم افزوده و در ماه سوم از شدت آن کاسته شده است. بیشترین علت عود، بیقراری پاها با فراوانی (37/21/8%) بوده است. در بررسی فراوانی شیوع سندرم پای بیقرار در بدو ورود به مطالعه، به طور کلی در شدت اولیه سندرم پای بیقرار در گروه مورد 34 نفر (43/9%) مبتلا به این سندرم نبوده که از این تعداد 23 نفر (32/9%) عود سوء مصرف مواد نیز نداشته و 11 نفر (11%) عود مصرف مواد داشته اند؛ در گروه کنترل 160 نفر (84/2%) سندرم اولیه پای بیقرار نداشته و مابقی اکثراً به میزان خفیف مبتلا به این سندرم بوده اند. تفاوت معناداری بین توزیع فراوانی شیوع سندرم پای بیقرار در این سه گروه وجود داشته است (P-Value<0/05) بحث و نتیجه گیری: ترک مصرف مواد بر میزان شدت سندرم پای بیقرار اثرگذار بوده که این تاثیر در ماه اول قابل ملاحظه است

کلمات کلیدی:

سندرم پای بیقرار، مت آمفتامین

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/497739>

