

عنوان مقاله:

مقایسه تاثیر دم کرده چای سیاه و آب جوشیده به عنوان درمان کمکی بر شدت کنژونکتیویت شیرخواران

محل انتشار:

مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، دوره 20، شماره 3 (سال: 1391)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

مهتاب عطارها - دانشجوی دوره دکتری بهداشت باروری، گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اراک

کتایون وکیلیان - استادیار گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اراک

محسن شمسی - مربی گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک

خلاصه مقاله:

مقدمه و هدف: شایع ترین علت ورم ملتخه چشم عفونت باکتریال و ویرال می باشد از طرفی با توجه به خاصیت ضد میکروبی چای سیاه پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر دم کرده چای سیاه همراه با آنتی بیوتیک در مقایسه با آب جوشیده به علاوه آنتی بیوتیک بر شدت کنژونکتیویت شیرخواران صورت پذیرفته است. روش کار: پژوهش حاضر از نوع مطالعه کارآزمایی بالینی دو گروهی و جامعه پژوهش شامل 110 نفر از شیرخواران مراجعه کننده به کلینیک اطفال بیمارستان امیرکبیر اراک در سال 1389 بوده است که به طور تصادفی در یکی از دو گروه دم کرده چای سیاه همراه با آنتی بیوتیک (گروه مداخله) و یا آب جوشیده به علاوه آنتی بیوتیک (گروه کنترل) قرار گرفتند. طول دوره درمان و شدت کنژونکتیویت (3-0) در روزهای اول (ویزیت)، سوم و هفتم درمان در هر گروه تعیین و سپس با یکدیگر مقایسه گردید. نتیجه نهایی: دم کرده چای سیاه همراه با آنتی بیوتیک شدت کنژونکتیویت و طول دوره درمان شیرخواران را کاهش داد، با توجه به خواص مفید چای می توان از آن به عنوان درمان کمکی کنژونکتیویت شیرخواران استفاده کرد.

کلمات کلیدی:

آب جوشیده، آنتی بیوتیک، دم کرده چای سیاه، شیرخواران، کنژونکتیویت

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/514807>

