

عنوان مقاله:

بررسی علل انجام عمل سزارین در زنان مراجعه کننده به کلینیک زنان و بارداری زایشگاه مهدیه شهرستان بم

محل انتشار:

مجله بهداشت و توسعه، دوره 1، شماره 3 (سال: 1391)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

سیده لیلا دهقانی - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

نرگس مهرالحسنی - پزشک عمومی، بیمارستان پاستور، بم، ایران

حدیث رستاد - کارشناس مامایی، کلینیک زنان، بارداری و آموزشی بیمارستان پاستور، بم، ایران

معین السادات ابراهیمی - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

خلاصه مقاله:

مقدمه: عمل سزارین به خروج جنین، جفت و غشاها از طریق برش دیواره شکم و رحم اطلاق م ی شود. میزان سزارین در دنیا 30-10 درصد و در ایران 50-65 درصد می باشد. مطالعه حاضر به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر انجام سزارین در شهرستان بم انجام شده بود. روشها: پژوهش حاضر به روش مقطعی بر روی 200 نفر از زنان مراجعه کننده به کلینیک زنان و بارداری زایشگاه مهدیه شهرستان بم در فاصله آبان ماه سال های 90-1389 انجام شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه توسط مامای آموزش دیده و پرونده های بهداشتی زنان مراجعه کننده استخراج شد. سپس داده ها وارد نرم افزار SPSS نسخه 15 شد و با استفاده از آزمون های Chi-square، Logistic regression و Independent-t تحلیل گردید. نتایج: 59 درصد زایما نها به روش سزارین انجام شده بود. سابقه سزارین، دیابت بارداری، تحصیلات پدر و مادر نوزاد، آزمون بدون استرس غیر فعال، عدم تناسب سر با لگن، توده بدنی بالای مادر و ترس از زایمان طبیعی، با انجام زایمان سزارین رابطه معنی داری نشان دادند ($P < 0/05$). بحث و نتیجه گیری: هر چند سزارین در بسیاری موارد نجات دهنده جان مادر و جنین است؛ اما علاوه بر اندیکاسیون های طبیعی، تحصیلات بالاتر والدین و ترس مادران از درد زایمان طبیعی نیز عوامل مهمی در افزایش آمار سزارین نسبت به زایمان طبیعی هستند. لازم است در مورد علل بالا بودن انجام سزارین در ایران مطالعات بیشتری صورت گیرد.

کلمات کلیدی:

عوامل مؤثر، سزارین، ایران

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/514942>

