

عنوان مقاله:

انگل سیستسیک زیر پوستی در طیور بومی: مشاهدات بالینی، تشخیص، درمان

محل انتشار:

دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

نویسندگان:

هادی توکلی - گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

محمد صادقی - دانشجوی دکترای عمومی دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه باهنر کرمان، کرمان، ایران

خلاصه مقاله:

و *laminosioples cysticola* یک جرب مولد کیست در پرندگان می باشد که اغلب در زیر پوست و روی سطوح ماهیچه ای یافت می گردد. انگل به ندرت در مناطق دیگر بدن مانند احشاء شکمی، ریه و پریتونیوم نیز می تواند ایجاد ضایعه نماید. چرخه زندگی آن به طور کامل شناخته نشده است ولی نوزادان پس از خارج شدن از تخم، تمام مراحل زندگی را در زیر پوست و یا روی ماهیچه ها سپری می کنند. گزارش حاضر به تشخیص جرب *laminosioples cysticola* در مرغ تخمگذار بومی و روش پیشگیری از آن در ماکیان می پردازد. تعداد 3 قطعه مرغ تخمگذار بومی متعلق به یک جمعیت 25 قطعه ای با میانگین سن 2 ساله، به بیمارستان تخصصی دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان ارجاع داده شدند. در معاینات بالینی لاغری و بی اشتهاپی پیش رونده دیده شد. از پرندگان نمونه مدفوع اخذ گردید و جهت بررسیهای تکمیلی تعدادی از پرندگان به سالن کالبدگشایی ارجاع داده شدند. در کالبدگشایی ندول های سفید تا کرمی رنگ به اندازه 2-0/5 میلی متر در بافت زیر پوست و بافت همبند زیر پوست دیده شد. در سایر ارگان ها جراحات کالبد گشایی دیده نشد. از ندول های ذکر شده نمونه برداری و به آزمایشگاه ارسال گردید. در مطالعات میکروسکوپ نوری، انگل هایی به طول 0/2-0/15 میلی متر و عرض 0/12-0/07 میلی متر در مراحل تکامل مختلف در داخل کیست ها دیده شدند در بررسی های تکمیلی انگل های دیده شده *laminosioples cysticola* تشخیص داده شد در حال حاضر اقدام درمانی و پیشگیرانه مشخصی جهت مبارزه با این جرب ارائه نشده است و تنها راه کنترل بیماری حذف پرنده آلوده و جلوگیری از تماس پرندگان سالم با پرنده آلوده می باشد

کلمات کلیدی:

جرب، *laminosioples cysticola*، مرغ بومی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/520771>

