

عنوان مقاله:

بکارگیری پرسشنامه اوسوستری به منظور ارزیابی میزان ناتوانی ناشی از کمردرد مزمن، قبل و بعد از یک دوره درمان دارویی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فوق تخصصی ولی عصر ناجا (عج)

محل انتشار:

فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی، دوره 1، شماره 3 (سال: 1391)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

علی مجیدی - بهداری کل ناجا، تهران، ایران

رضا هیرادآسا - بهداری کل ناجا، تهران، ایران

حامد اقدم - مرکز تحقیقات کاربردی، بهداری کل ناجا، تهران، ایران- نویسنده مسئول

هادی شیرزاد - مرکز تحقیقات کاربردی، بهداری کل ناجا، تهران، ایران

خلاصه مقاله:

مقدمه: کمر درد یکی از شایعترین مشکلات مورد توجه سلامت و اقتصاد جامعه می باشد. این مطالعه باهدف مقایسه میزان درد، ناتوانی در بیماران مبتلا به کمر درد مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر (عج) ناجا با استفاده از پرسشنامه اوسوستری قبل و بعد از یک دوره درمان دارویی انجام گرفته است. مواد و روشها: طی یک مطالعه توصیفی-تحلیلی، 167 بیمار مبتلای به کمر درد بیمارستان فوق تخصصی ولی عصر ناجا که به تشخیص متخصص معالج به مدت شش هفته با گروه داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی تحت درمان قرار گرفتند، بر اساس فرمول کوکران و به شیوه در دسترس در نظر گرفته شدند. پرسشنامه شدت و ناتوانی ناشی از کمردرد اوسوستری قبل و بعد از درمان در مورد کلیه بیماران تکمیل گردید. از تفاضل نمره محاسبه شده قبل و بعد از درمان، میزانی بدست می آید که کمتر از 10٪ به عنوان بهبودی نسبی و بیشتر از 10٪ به عنوان بهبودی قابل قبول در نظر گرفته می شود. اطلاعات جمع آورنده توسط نرم افزار SPSS و آماره های توصیفی فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، آزمون تی زوجی مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که بین نمرات بیماران در متغیر ناتوانی ناشی از کمر درد در مرحله قبل از درمان و بعد از درمان تفاوت معنادار وجود دارد (به ترتیب 85 / 76 ± 8 / 34 در مقابل 89 / 37 ± 7 / 26 ، $P=0/0001$). یافته ها همچنین نشان می دهند که 32/3٪ از بیماران در نتیجه درمان به بهبودی کمتر از 10٪ و 67/7٪ به بهبودی 10٪ یا بیشتر دست یافتند. نتایج نشان داد بین جنسیت و میزان بهبودی کمردرد رابطه معنادار آماری وجود دارد ($P=0/016$). نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد که درمان دارویی در کاهش ناتوانی ناشی از کمر درد موثر است و از پرسشنامه اوسوستری نیز می توان در کنار تشخیص های حوزه پزشکی به منظور ارزیابی ناتوانی ناشی از کمر درد استفاده کرد.

کلمات کلیدی:

کمردرد، ناتوانی ناشی از کمر درد، پرسشنامه اوسوستری، بهبودی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/541889>



