

عنوان مقاله:

بررسی میزان شیوع پادتن ضد ویروس هپاتیت C (HCV-Av) در بیماران پسوریازیزی شهر کرمان

محل انتشار:

مجله پزشکی بالینی ابن سینا، دوره 12، شماره 1 (سال: 1384)

تعداد صفحات اصل مقاله: 5

نویسندگان:

ابرج اسفندیارپور - دانشیار گروه پوست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

سودابه زندی - استادیار گروه پوست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

زهرا رهنما - استادیار گروه پوست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

فرشید درویش دماوندی - متخصص پوست

خلاصه مقاله:

پسوریازیس یک بیماری پوستی مزمن، التهابی و پوسته دار است که در بسیاری از موارد عامل اتیولوژیک خاصی رانمی توان برای آن یافت. ارتباط پسوریازیس با ویروس هپاتیت C (HCV) در بعضی مطالعات ذکر شده است. به همین لحاظ این مطالعه با هدف تعیین میزان شیوع پادتن ضد ویروس هپاتیت C (HCV-Av) در بیماران پسوریازیزی شهر کرمان انجام گرفت. در این مطالعه HCV-Av به روش (ELISA (Enzyme Linked immunosorbent assay) جهت تأیید در موارد مثبت به روش (RIBA (Recombinant Immunoblot) assay بیمار پسوریازیزی به عنوان گروه مورد و ۱۴۹ فرد بدون بیماری پسوریازیس بعنوان گروه شاهد مورد بررسی قرار گرفت. از ۱۳۲ بیمار ۴ مورد (۳٪) و از ۱۴۹ نفر شاهد ۳ نفر (۲٪) HCV-Av تأیید شده به روش RIBA بدست آمد که اختلاف آماری معنی داری بین دو گروه دیده نشد ($P=0/71$). همچنین درمقایسه باشیوع HCV-Av درجمعیت اهداء کنندگان خون درکرمان (۱٪)، اختلاف آماری معنی داری بین گروه بیماران پسوریازیزی و این گروه از جهت مثبت شدن HCV-Av وجود نداشت. ($P=0/39$). در بیماران پسوریازیزی بین دو گروه مثبت و منفی از نظر HCV-Av، اختلاف معنی داری از جهت سن، جنس، نوع بالینی بیماری پسوریازیس، سابقه عوامل خطر اکتساب HCV و طول مدت بیماری وجود نداشت ($P>0/05$). در بیماران مورد مطالعه ارتباط با اهمیتی بین پسوریازیس و هپاتیت ویروسی (HCV) پیدانشد و مشخص گردید که بیماران پسوریازیزی تفاوتی را از جهت مثبت شدن HCV-Av نسبت به سایر افراد جامعه نشان نمی دهند.

کلمات کلیدی:

آنتی بادیهای هپاتیت C، اهداء کنندگان خون، پسوریازیس

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/570059>

