

عنوان مقاله:

معرفی روش اصلاح جابه جایی شیردان به چپ باروش لاپاروسکوپی

محل انتشار:

پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران (سال: 1387)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

نویسندگان:

فاطمه فروزانفر - دانشجوی سال چهارم دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد

سمیه براتی - دانشجوی سال چهارم دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد

کامران شریفی - گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد

محمدرضا دوازده امامی - گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد

خلاصه مقاله:

تکنیک دو مرحله ای : مرحله اول در حالت ایستاده گودی paralombar چپ و سه دنده آخراستریل می شوند . دو شکاف زده کانول تروکارداخل گودی تهیگاهی قرار گرفته، laparoscope راد اخل canula گذاشته اکتشاف در حفره شکمی انجام می شود . Toggle bar در شیردان گذاشته می شود . toggle bar ازبین تروکار گذشته وارد مجرای شیردان می شود . سپس laparoscope و toggle bar را برداشته وبخیه می زنیم . درمرحله دوم حیوان را به پشت خوابانده ناحیه paramedian راست استریل می شود . laparoscope و forceps داخل پورتال گذاشته سپس شیردان در موقعیت آناتومیکی در ست قرارمی گیرد ، laparoscope و cannula را برداشته وبخیه می زنیم . تکنیکیک رحله ای : حیوان را به پشت خوابانده و سه شکاف در موقعیتهای (2 cm چپ ناف، 5 cm به راست و 3 cm به جلو ی ناف، 3 cm به عقب و 7 cm به راست زائده خنجرى جناغ (ایجاد می کنیم . موقعیت شیردان را با forceps مشخص کرده شیردان را ازقسمت میانی خم بزرگ گرفته سوزن را وارد ما هیچه های شکم کرده با کشیدن نخ بخیه به طرف د یواره شکم، شیردان جا افتاده و موضع بخیه می شود . این روشها برای اصلاح LDA ، کاهش عوارض بیماری وکاهش دوریختن شیرمناسب می باشد و باعث کم شدن زمان وهزینه جراحی وکاهش زمان التیام می شوند .

کلمات کلیدی:

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/59597>

