

عنوان مقاله:

بررسی عوارض مادری و جنینی حاملگی نوجوانان در مقایسه با بارداری جوانان

محل انتشار:

همایش بارداری ایمن (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

نویسندگان:

طیبه آزادی میانکوهی - کارشناس ارشد مامایی، مدیریت درمان تامین اجتماعی کرمانشاه، کرمانشاه

آریتا آزادی - کارشناس مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه

خلاصه مقاله:

بارداری در نوجوانان یکی از چالش های پیش روی جوامع بشری مختلف می باشد تعداد حاملگی ها در نوجوانی روبه افزایش است و تقریباً 11% تولدها را شامل می شود. مادران نوجوان از نظر ابتلا به عوارض بارداری جزء گروههای پرخطر محسوب می شوند، لذا این مطالعه با هدف بررسی عوارض مادری و جنینی حاملگی نوجوانان در مقایسه با بالغین انجام گرفت مواد و روش های این مطالعه به روش مروری با جستجو در سایت هایی از قبیل Google PubMedscholar SID, EMBASE, انجام شد. مقالات هماهنگ با معیارهای مورد نظر جمع آوری و به صورت یک مقاله گزارش شد یافته ها بررسی ها نشان می دهد که تراکم معدنی استخوان در زنان باردار نوجوان در مقایسه با زنان بالغ به طور معنی داری کاهش 2 برابر در بین زنان باردار نوجوان افزایش می یابد و شدت استیوپروز افزایش می یابد شیوع کم خونی و شانس ابتلا به آنمی 3 مطالعات نشان داده است غلظت هایغیر طبیعی هموگلوبین باعث وزن کم هنگام تولد در مادران باردار نوجوان میگردد زنانی که در اواسط دوره نوجوانی بارداری شوند، نسبت به سایر زنان بیشتر در معرض خطر افسردگی هستند یافته ها حاکی از آن است که مرگ مادر، فیستول های رکتوواژینال، سرطان سرویکس، زایمان زودرس، تاخیر رشد داخل رحمی و فراوانی نوزاد پره ترم به طور معنی داری از نظر آماری در زنان نوجوان بیشتر از زنان جوان می باشد بحث و نتیجه گیری مراقبت پره ناتال تاثیر به سزایی در نتایج خوب بارداری دارد و می تواند تا حدودی عوارض بارداری زودرس را کاهش دهد با اجرای راهکارهای مناسب و آموزش جهت کاهش حاملگی در این طیف سنی پرخطر، می توان از اختلالات تکاملی کودکان و پیامدهای مضر آن پیشگیری نمود. بالا بردن آگاهی جامعه درباره عوارض حاملگی زودرس و اجرای سیاست های فقرزدایی می توانند در جهت بهبود وضعیت زنان موثر باشند

کلمات کلیدی:

بارداری، نوجوانی، حاملگی پرخطر

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/614497>

