

عنوان مقاله:

مقایسه ی الکسی تایمیا در بیماران PTSD ، دوقطبی و افراد سالم

محل انتشار:

کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی (سال: 1394)

تعداد صفحات اصل مقاله: 13

نویسندگان:

بهنام فرامرزی - کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه علوم تربیتی، تبریز، ایران

محمد رضا ملکی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد، واحد تبریز، گروه علوم تربیتی، تبریز، ایران

جواد یعقوبی - کارشناسی معارف و الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه علوم انسانی، واحد سراب، ایران

خلاصه مقاله:

این پژوهش با هدف مقایسه ی الکسی تایمیا در بیماران PTSD ، دوقطبی و افراد سالم به مرحله ی اجرا درآمد. با استفاده از روش تحقیق علی مقایسه ای و روش نمونه گیری تصادفی ساده 60 نفر بیمار مبتلا به دوقطبی و 30 (PTSD نفر دوقطبی و 030 نفر PTSD) از میان بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های روانپزشکی ایثار اردبیل و رازی تبریز و 30 نفر افراد از گروه سالم که دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل بودند از طریق همتاسازی با گروه بیمار انتخاب شدند. با استفاده از فرم ثبت اطلاعات و چک لیست های تهیه شده که برای تشخیص افراد مبتلا به دوقطبی و PTSD به کار گرفته شده بود افراد مبتلا به دوقطبی و PTSD مشخص گردیدند و با استفاده از پرسشنامه ی الکسی تایمیا تورتو با ضریب پایایی بازآزمایی 0/58 تا 0/75 و آزمون آماری مانووا مورد آزمون قرار گرفتند نتایج نشان داد که از نظر الکسی تایمیا و خرده مقیاس های آن بین گروه های سالم ، دوقطبی ، PTSD تفاوت معنی داری وجود دارد و میزان الکسی تایمیا در افراد PTSD 85/92 در افراد دوقطبی 81/68 و در افراد سالم 75 می باشد پس معلوم می شود که الکسی تایمیا در افراد PTSD بیشتر از افراد دوقطبی است و الکسی تایمیا در افراد دوقطبی بیشتر از افراد سالم است بنابراین میزان الکسی تایمیا در دو گروه بیشتر از افراد سالم است.

کلمات کلیدی:

مقایسه، الکسی تایمیا، PTSD ، دوقطبی، پرسشنامه

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/625389>

