

عنوان مقاله:

بررسی شیوع بیش فعالی در کودکان اتیستیک و رابطه آن با ایجاد حرکات تکراری و عدم تماس چشمی در این کودکان

محل انتشار:

نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

نویسنده:

مریم تدین طهماسبی - کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد آیت الله امینی

خلاصه مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی شیوع بیش فعالی در کودکان اتیستیک و رابطه آن با ایجاد حرکات تکراری و عدم تماس چشمی در این کودکان انجام گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کودکان اتیستیک شهرستان رشت می باشند که زیر نظر مراکز بهزیستی این شهرستان پذیرش و تحت درمان قرار گرفتند ($n=50$). با توجه به محدودیت جامعه آماری نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه اختلال کمبود توجه/بیش فعالی SNAP-IV و مقیاس اتیسم گیلیام (GARS) بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون نشان داد بین شیوع بیش فعالی با حرکات تکراری رابطه مثبت و معناداری ($r=0/296$, $P=0/037$) وجود دارد که 0/087 از واریانس تغییرات حرکات تکراری توسط بیش فعالی در مدل توجیه می شود. بر اساس نتایج بین بیش فعالی با عدم تماس چشمی رابطه مثبت و معناداری ($r=0/309$, $P=0/029$) وجود دارد. همچنین ضریب تعیین نشان می دهد که 0/095 از واریانس تغییرات عدم تماس چشمی توسط بیش فعالی در مدل توجیه می شود. با توجه به سطح معنی داری آزمون t مستقل ($\text{sig}=0/319$)؛ فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود اختلاف معنی دار بین میانگین های دو گروه زن و مرد تایید می گردد.

کلمات کلیدی:

اتیسم، بیش فعالی، حرکات تکراری، عدم تماس چشمی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/634357>

