

عنوان مقاله:

گزارش یک مورد مسمومیت با ماری جوآنا در یک قلاده سگ نژاد هاسکی

محل انتشار:

یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران (سال: 1396)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

نویسندگان:

سید میلاد واحدی - گروه بیماری های داخلی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

لیلا لنگرانی مهاجر - دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

سید جاوید آل داود - گروه بیماری های داخلی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

خلاصه مقاله:

مقدمه: ماریجوآنا ترکیبی از گیاه شاهدانه برای استفاده به عنوان ماده محرک تفریحی، داروی فعال کننده روان یا داروی طبی است. مسمومیت با ماری جوآنا می تواند در حیوانات خانگی که به گیاه ماری جوآنا یا ترکیبات حاوی آن ها دسترسی دارند رخ دهد. تراهِیدروکانبینول ترکیب موثر همه فراورده های گیاه شاهدانه و عامل اصلی آثار سرخوشی آور آن است. از عوارض موقتی مهم مصرف ماری جوآنا میتوان به کاهش حافظه کوتاه مدت، خشکی دهان، سرخی دیدگان، اختلال در مهارت های حرکتی و گاهی احساس اضطراب و وحشت اشاره کرد. اغلب حیوانات مسموم چندین ساعت پس از مسمومیت بهبود می یابند. روش کار: یک قلاده سگ 3 ساله نژاد هاسکی با علایم تاکی کاردی (200 عدد در دقیقه) له له زدن، گیجی، پر خونی صلبیه و حالات اضطراب به یک بیمارستان خصوصی در شهر تهران مراجعه نمود. در تاریخچه مشخص شد که سگ مقادیر زیادی از گیاه ماری جوآنا را بلعیده است. جهت جلوگیری از جذب بیشتر ذغال فعال به حیوان داده شد. مایع درمانی و داروی دیازپام به میزان 4/0 kg/mg به حیوان تزریق شد و پس از حدود دو ساعت کاهش تعداد ضربان (120 عدد در دقیقه)، هوشیاری و بهبودی پر خونی صلبیه در حیوان مشاهده گردید. بحث و نتیجه گیری: مسمومیت با کانبینوئید ها در سگ می تواند سبب اضطراب، له له زدن، آشفتگی، بی حالی، عدم تعادل، اسهال، استفراغ و بی اختیاری ادرار و مدفوع شود. بهترین درمان جلوگیری از استرس بیشتر تا زمان رفع مسمومیت می باشد. در این زمان می بایست از هر گونه تحریک حیوان جلوگیری شود. ایجاد استفراغ در موارد بلع مقادیر حجیم ماری جوآنا یک روش درمانی است. همچنین استفاده از داروهای آرامبخش هم می تواند کمک کننده باشد.

کلمات کلیدی:

مسمومیت، سگ، ماری جوآنا

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/655452>

