

عنوان مقاله:

بررسی تاثیر خشکه دار بر کمیت و کیفیت تجدید حیات در مدیریت اکوسیستم های طبیعی

محل انتشار:

دومین همایش ملی توسعه پایدار استان کهگیلویه و بویر احمد (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

ضیاء الدین باده یان - استادیار گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

معصومه منصوری - دانشجوی دکترا جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

خلاصه مقاله:

خشکه دار یکی از 15 شاخص اصلی تنوع زیستی توسط آژانس محیط زیست اروپا پیشنهاد شد. اطلاعات فراوانی در مورد ارزشهای اکولوژیکی و کارکردهای خشکه دار در اکوسیستم های جنگلی در سراسر دنیا موجود است. هرچندکه بسیاری از این اطلاعات از طریق نوشته های علمی دانشگاهی، گزارشات منتشر نشده در قالب پایان نامه ها و در شبکه وسیع جهانی پراکنده باشند. خشکه دارها (ایستاده یا افتاده در حال مرگ و مرده) یکی از عناصر اصلی و اجزای ضروری جنگلهای طبیعی به شمار می آیند. همچنین خشکه دار را به عنوان یک زیستگاه مهم برای حیات وحش معرفی کردند و به طور فزایندهای یکی از اجزای مهم در عملکرد اکوسیستم های جنگلی محسوب و تبدیله بخشی لاینفک از مدیریت جنگل شده است. اخیرا در کنوانسیون های بین المللی و کمیته های سیاستگذاری ملی به منظور پایداری تنوع زیستی و عملکردهای اکوسیستم حفظ خشکه دار را توصیه می کنند. در هر صورت، با وجود اهمیت خشکه دارها کماکان در برخطموارد اقدام به برداشت اینگونه درختان اقدام می شود. در برخورد با این چالش ها، موضوعاتی با مقاله حاضر در قالب یک چارچوب کلی وبا روش توصیفی هستند، روشهایی برای شناخت، خصوصیات و برای ارزیابی خشکه دار از سه پارامتر اصلی (1) خشکه دارها و افزایش تنوع زیستی (2) نقش خشکه دارها در ایجاد زیستگاه، (3) اهمیت خشکه دار در تجدیدحیات طبیعی جنگل استفاده گردید و به بررسی اهمیت خشکه دار در مدیریت پایدار جنگل پرداخته شده است.

کلمات کلیدی:

خشکه دار، زیستگاه، تنوع زیستی، تجدیدحیات

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/657588>

