

عنوان مقاله:

مقایسه آلکسی تیمیا در بیماران مولتیپل اسکروزیس و افراد عادی شهر اصفهان

محل انتشار:

کنگره بین المللی بهداشت روان و علوم روانشناختی (سال: 1396)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

نویسندگان:

زهره حاجی زاده - کارشناسی ارشد شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

مژگان عارفی - استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

خلاصه مقاله:

هدف از این مطالعه مقایسه آلکسی تیمیا در بیماران مولتیپل اسکروزیس و افراد عادی شهر اصفهان در سال 1393 بود. با توجه بهماهیت موضوع، پژوهش از نوع پس رویدادی (علی مقایسه ای) بوده و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیمار ام.اس که عضوانجمن ام.اس اصفهان بوده و کلیه همراهان سالم بیمار که در شش ماهه دو 93 به انجمن ام.اس اصفهان مراجعه کرده بودند، می باشند. بدین منظور 30 نفر بیمار مبتلا به ام.اس و 30 نفر همراه سالم به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه آلکسی تیمیا تورنتو- 20 بشارت (2007) بود. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی و نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین آلکسی تیمیا در بیماران مولتیپل اسکروزیس و افراد عادی سالم تفاوت معنی دار وجود دارد. از سه بعد آلکسی تیمیا بین دو بعد دشواری در تشخیص احساسات و دشواری در توصیف احساسات تفاوت معنادار یافت شد. این مطالعه نشان داد که در بیماران ام.اس میزان آلکسی تیمیا بالاتر و از افراد عادی بوده است. این مطالعه نشان دهنده نقش آلکسیتیمیا در درک و فهم بهتر آسیب شناسی روانی در بیماران ام.اس است. بنابراین ارزیابی و توجه به آن به عنوان عوامل موثر در فرایند درمان این بیماران ضروری به نظر می رسد.

کلمات کلیدی:

آلکسی تیمیا، مولتیپل اسکروزیس، شهر اصفهان

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/661220>

