

عنوان مقاله:

ارزیابی ریسک کمر درد ناشی از جابجایی بیمار با استفاد از شاخص MAPO در پرسنل پرستاری یکی از بیمارستان های تهران و ارایه راهکارهای کنترلی

محل انتشار:

مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، دوره 3، شماره 4 (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

نویسندگان:

پریسا آزاد - کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

علیرضا چوبینه - استاد، گروه بهداشت حرفه ای، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

فرید غفاری - کارشناس ارشد، گروه بهداشت و درمان، سازمان صنایع دفاع، تهران، ایران

خلاصه مقاله:

مقدمه: یکی از عمده‌ترین مشکلات در بیمارستان که منجر به شیوع بالای اختلالات اسکلتی-عضلانی در بین کارکنان آن میشود مربوط به فعالیتهای حمل و جابجایی بیماران است. این تحقیق به منظور بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در افراد دارای وظیفه جابه جایی بیمار با استفاده از شاخص MAPO در سال 1394 در یکی از بیمارستانهای نظامی شهر تهران انجام گرفت. روش کار: این پژوهش مقطعی در بین 230 نفر از پرستاران یکی از بیمارستانهای نظامی 400 تختخوابی شهر تهران انجام گرفت. روش گردآوری اطلاعات پرسشنامه نوردیک، چک لیستهای ارزیابی بار ناشی از جابجایی بیمار به روش MAPO و پرسشنامه ویژگیهای دموگرافیکی بود. تجزیه و تحلیل آماری دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام گرفت و برای بررسی ارتباط بین متغیرها از آزمون آماری کای دو استفاده گردید. یافتهها: از اهم نتایج میتوان به بالا بودن شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در بین کارکنان به خصوص اختلالات کمر، شانه، مچ و غیره اشاره کرد که کمر درد (75%) بیشترین شیوع را در بین کارکنان داشت همچنین درصد فراوانی اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان زن بیشتر از کارکنان مرد بود. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در بین پرسنل پرستاری دارای وظیفه جابه جایی بیمار بال می باشد و لذا نیاز به مداخله ارگونومیکی در طراحی محیط، ابزار و تجهیزات همزمان با مداخله آموزشی وجود دارد.

کلمات کلیدی:

اختلالات اسکلتی عضلانی، پرسنل پرستاری، MAPO، جابجایی بیمار

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/666029>

