

عنوان مقاله:

تشدید تعلیف دام از گیاهان سعی مراتع در شرایط خشکسالی

محل انتشار:

دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن (سال: 1388)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

نویسندگان:

محسن راستی - اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

احمد رضا رنجیری - اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

مسعود برهانی - اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

محمد تقی فیضی - کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

خلاصه مقاله:

بر اساس آمار سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، تعداد کل دام در منطقه سمیرم 1277306 واحد دامی است که از این تعداد معادل 984736 واحد دامی مربوط به دام عشایر و مابقی 292570 واحد دامی، دام روستائیان را تشکیل می‌دهد. بررسی منابع تعلیف دام در بیلاق - قشلاق و میانبند نشان می‌دهد که چرای آزاد مهمترین عامل ترغیب عشایر به کوچ و جابجایی است. در گذشته مراتع سرسبز با گیاهان متنوع و خوشخوراک اصلی‌ترین منبع تامین علوفه دام بوده است. اما در چند دهه گذشته مراتع، بدلیل مختلف که مهمترین آن طی سالهای اخیر خشکسالی بوده است، توان تعلیف گله‌های فشرده و انبوه دامی را از دست داده و بدین ترتیب از دامنه تعلیف رایگان کاسته شده است. در تحقیقات انجام شده به منظور تعیین نقش اقلیم بر روی گیاهان مشخص گردیده است که در زمان خشکسالی گیاهان سمی سریع‌تر از گیاهان خوشخوراک استقرار پیدا می‌کنند. در واقع با کاهش بارش و وقوع خشکسالی، به دلیل چرای سریع گونه‌های خوشخوراک و استفاده کمتر از گیاهان سمی، فراوانی نسبی آنها افزایش می‌یابد و احتمال تعلیف دام و مسمومیت ناشی از آنها افزایش می‌یابد. در این مقاله ضمن تاکید روی این نکته که گیاهان سمی از اجزای طبیعی مراتع هستند، وضعیت گیاهان سمی یکی از مراتع سمیرم بررسی شده است و در پایان پیشنهاداتی برای کاهش اثرات گیاهان سمی ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی:

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/67505>

