

عنوان مقاله:

ارتباط گیرنده های استروژن و پروژسترون با متاستاز غدد لنفاوی سرطان پستان

محل انتشار:

هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان (سال: 1391)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

نویسندگان:

علی پورزند - دانشگاه علوم پزشکی تبریز

محمدبصیر ابوالقاسم فخری - دانشگاه علوم پزشکی تبریز

شهریار هاشم زاده - دانشگاه علوم پزشکی تبریز

امیر دریانی - دانشگاه علوم پزشکی تبریز

خلاصه مقاله:

مقدمه: افزایش شواهد اهمیت بررسی سن پایین، وضعیت گیرنده های استروژن و پروژسترون، و HER-2 را در سرطان های اولیه پستان نشان می دهد. ما در این مطالعه به تجزیه و تحلیل تفاوت در وضعیت گیرنده های استروژن و پروژسترون بین زنان جوان تر و مسن تر مبتلا به سرطان پستان پرداختیم. هدف ما از این مطالعه تعیین وجود ارتباط بین گیرنده های استروژن و پروژسترون با متاستاز غدد لنفاوی در سرطان پستان است. مواد و روش ها: در یک مطالعه تحلیلی-مقطعی، 105 زن مبتلا به سرطان پستان که بین سالهای 1383 تا 1386 تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. سن، اندازه، وضعیت گیرنده های هورمونی، HER-2 و P53 به عنوان شاخص ممکن برای درگیری غدد لنفاوی مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها: طبق مطالعه ما بین وضعیت گیرنده پروژسترون مثبت و جوان تر از 40 سال بودن ارتباط مستقیم وجود دارد ($p > 0.05$) همچنین در مقایسه با زنان مسن تر، احتمال بزرگتر و پیشرفته تر بودن تومور در زنان جوان تر بیشتر است ($P > 0.05$) علاوه بر این در بیماران با وضعیت گیرنده پروژسترون منفی، احتمال بیشتری به داشتن HER-2 مثبت وجود دارد ($p > 0.05$). تفاوت در گرایش به متاستاز غدد لنفاوی بین وضعیت گیرنده های هورمونی از نظر آماری معنی دار نبودند. نتیجه گیری: شاید پیشرفته تر و بزرگتر بودن تومورهای سرطان پستانی در زنان جوان تر با وضعیت گیرنده های هورمونی در ارتباط است. مطالعات بعدی باید بر روی وضعیت گیرنده های هورمونی و متاستاز غدد لنفاوی متمرکز شوند.

کلمات کلیدی:

سرطان پستان، گیرنده استروژن، گیرنده پروژسترون، متاستاز غدد لنفاوی، سن

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/712700>

