

عنوان مقاله:

آمنوره ثانویه به دنبال شیمی درمانی در سرطان پستان

محل انتشار:

نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان (سال: 1392)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

نویسندگان:

ساره عبداللهی فرد - کارشناس ارشد مامایی، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم

فاطمه قوی - کارشناس ارشد مامایی، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم

محمدهاشم عبدی - کارشناس ارشد پرستاری، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

سمیه رضوانلی - کارشناس ارشد پرستاری، مربی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

خلاصه مقاله:

مقدمه و هدف: درمان های شیمی درمانی موجود ، علیرغم افزایش میزان بقاء زنان غیریبایسه مبتلا به سرطان پستان، ممکن است با عوارض کوتاه مدت و دیررس داروها از جمله اختلال عملکرد تخمدان و یایسگی زودرس همراه باشند. هدف از این مطالعه تعیین آمنوره ثانویه ناشی از شیمی درمانی در مبتلایان به سرطان پستان مراجعه کننده به کلینیک سرطان سینه مطهری شیراز سال 1391 بود. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از بررسی حدود 30 زن مبتلا به سرطان پستان غیر یایسه، تحت درمان با داروهای شیمی درمانی، که قبل از شروع شیمی درمانی دارای قاعدگی نرمال بودند، و در طی سال 1391 به کلینیک سرطان سینه مطهری شیراز مراجعه می کردند، انجام گرفت. نمونه گیری بر اساس مبتنی بر هدف و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفت. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که بیش از 80 درصد از بیماران پس از شروع داروهای شیمی درمانی، دچار آمنوره ثانویه شدند. نتایج نشان داد که 60 درصد مبتلایان به سرطان پستان بدنبال مصرف داروی لتروزول (000.0

کلمات کلیدی:

آمنوره، سرطان پستان، شیمی درمانی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/713015>

