

عنوان مقاله:

اپیدمیولوژی سرطان پستان

محل انتشار:

نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان (سال: 1392)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

نویسنده:

مهرانه شجاعی - کارشناس ارشد مامایی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

خلاصه مقاله:

مقدمه: در حال حاضر، در میان نوزادان دختر آمریکایی خطر پیدایش کانسر پستان در طول زندگی 12٪ یعنی 1 نفر از هر 8 نفر است که نسبت به سال 1940 دو برابر شده است. از سال 1990 تا کنون میزان بروز با سرعت 3٪ در سال کاهش یافته که ناشی از کاهش استفاده از هورمون درمانی در دوران یایسگی و استفاده از ماموگرافی است. مواد و روشها: این مطالعه مروری و بر اساس مقالات 2011 الی 2013 تهیه شده است. نتایج: مطالعات نشان داده اند که احتمال سرطان پستان با افزایش سن زیاد می شود یعنی در خانم 70 ساله، 6 برابر یک خانم 40 ساله است. 97٪ مرگ و میر ناشی از کانسر پستان در زنان بالای 40 سال دیده می شود. شیوع بالای کانسر و مرگ و میر در اروپا در سال 2012 به سرطان پستان نسبت داده شد. در کشورهای اروپایی مانند ایرلند، دانمارک، بلژیک و فرانسه بیشترین درصد مبتلا و کشورهای پرتغال و اسپانیا کمترین میزان ابتلا را دارند. در ایران، شیوع کشورهای غربی بوده و در رده سنی 40-50 شایعتر است بعد از سرطان دهانه رحم و پوست، سومین سرطان شایع زنان است. در ایران هر ساله حدود 10/000 ابتلای جدید و 1500 مورد فوت از سرطان پستان وجود دارد. روند رشد سرطان در کشورهای دیگر ثابت ولی ایران سالی 8 در 100/000 افزایش رشد در سرطان پستان داشته است. 17 استان در ایران بیشترین آمار سرطان پستان را داشته اند. نتیجه گیری: بعضی از فاکتورهای مهم ژنتیکی مانند سن، استعداد ژنتیکی، سن منارک و یایسگی را نمی توان تغییر داد. ولی می توان افراد در معرض خطر را تشویق به انجام خودآزمایی ماهیانه پستان از 20 سالگی، معاینه توسط پزشک هر 6 ماه و ماموگرافی سالیانه از 25 سال و در افراد عادی از 40-35 سال شروع نموده است. لذا با تشخیص به موقع می توان از مرگ و میر این سرطان پیشگیری نمود.

کلمات کلیدی:

سرطان پستان، اپیدمیولوژی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/713173>

