

عنوان مقاله:

تاثیر عوامل محیطی بر بیماری مالاریا در نواحی جنوب شرقی ایران

محل انتشار:

نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسنده:

شهره مرادپور - کارشناس ارشد جغرافیای پزشکی، دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:

امروزه، با بیش از 100 سال تحقیقات علمی در زمینه ریشه کنی مالاریا این بیماری همچنان یکی از مهم ترین محدودیت های زیست محیطی و بهداشتی در بیش از 90 کشور با جمعیتی بالغ بر 2 میلیارد و 400 میلیون نفر میباشد و سالانه حداقل 300 میلیون مورد بیماری و روزانه حدود 3000 مورد مرگ به بار میآورد. بیماری مالاریا یکی از بیماری های واگیرداری است که سالانه 300 تا 500 میلیون نفر به آن مبتلا می شوند و شرایط اقلیمی همچون بارش، درجه حرارت و رطوبت عوامل تاثیرگذار بر توزیع جغرافیایی و شیوع این بیماری هستند. از آنجا که نواحی جنوب و جنوب شرقی ایران جزء مناطق آندمیک مالاریا محسوب شده و سه استان جنوب شرق، استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بخش جنوبی استان کرمان در مجموع، 95 درصد از کل موارد کشور را به خود اختصاص داده اند. بنابراین، لزوم بررسی و مطالعه در منطقه ضروری به نظر میرسد. به این منظور، در این پژوهش سعی شده است تاثیر پارامترهای اقلیمی مانند دما، بارش و رطوبت بر روند تغییرات این بیماری در نواحی جنوب شرق کشور مورد ارزیابی قرار گیرد. در این مطالعه، به بررسی رابطه عوامل اقلیمی با بیماری مالاریا به صورت کتابخانه ای پرداخته شده است که نتایج این پژوهش نشان داد با افزایش بارش و رطوبت میزان ابتلا کاهش پیدا می کرد و با افزایش دما تعداد مبتلایان افزایش می یابد.

کلمات کلیدی:

مالاریا، جغرافیای پزشکی، عناصر اقلیمی، نواحی جنوب شرق ایران

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/733538>

