

عنوان مقاله:

بررسی وضعیت قطری گونه بلوط در منطقه قلعه دره سی و ایل یوردی کلبر

محل انتشار:

کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی (سال: 1396)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

میلاد صفری - دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل شناسی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

کیومرث سفیدی - استادیار گروه منابع طبیعی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

عمید ذوالفقاری صادق - دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا دانشگاه گیلان، رشت، ایران

محمد رضی الهیان - کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی آذربایجان شرقی

خلاصه مقاله:

جنگل های ارسباران یکی از مهمترین و با ارزش ترین رویشگاه های جنگلی است که در ناحیه شمال غرب کشور واقع شده است. وضعیت تراکم درختان بلوط سیاه (Quercus macranthera Fish & Meyer) و بلوط سفید (Q. petraea) در این مناطق زیاد بوده و در مقایسه با تراکم درختان ممرز در مرتبه ی دوم قرار دارد و همراه با درختان افرا، ممرز، وسایر گونه ها پراکنش دارد. این پژوهش باهدف بررسی وضعیت قطری گونه بلوط سیاه در جنگل یوردی و قلعه دره سی شهرستان کلبر انجام گرفت. بدین منظور تعداد 9 پلات یک هکتاری در رنج های ارتفاعی مختلف بصورت تصادفی سیستماتیک انتخاب و در داخل هر یک از این پلات ها تعداد 9 قطعه نمونه 25×25 متری به صورت تصادفی - سیستماتیک برداشت شد. تمامی داده های برداشت شده در آمار برداری در داخل نرم افزار excel آنالیز و محاسبه گردید و نتایج بررسی نشان داد که تراکم سطح مقطع و میانگین تاج پوشش در سطح 5 درصد معنی دار قرار گرفته است. وضعیت قطری در رنج ارتفاعی دوم دارای بیشترین فراوانی و قطر درختان بلوط در سه رنج ارتفاعی ذکر شده در محدوده 10-25 سانتی متر دارای بیشترین حالت قطری را داراست.

کلمات کلیدی:

جنگل ارسباران، بلوط سیاه، پراکنش، بلوط سفید

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/740228>

