

عنوان مقاله:

پیش بینی پذیرش درد، براساس استرس ادراک شده در افراد مبتلا به آرتریت روماتوئید

محل انتشار:

دومین کنفرانس ملی روانشناسی و مشاوره (سال: 1396)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

نویسندگان:

مینو بهرامی راد - درجه علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

زهره رافضی - درجه علمی، دانشگاه علامه طباطبائی

علیرضا شکرگزار - درجه علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

خلاصه مقاله:

هدف پژوهش پیش بینی پذیرش درد، براساس استرس ادراک شده در افراد مبتلا به بیماری آرتریت روماتوئید بود. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری کلیه بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به مراکز روماتولوژی مناطق 2،3،5،6،7،18 شهر تهران در سال 1396، به تعداد 480 نفر بود که از میان آنها، بر اساس جدول کرجسی و مورگان (1970) و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 214 نفر از بیماران، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند، اما با توجه به ریزش برخی نمونه ها، تعداد 210 نفر، به عنوان نمونه نهایی باقی ماندند. داده های پژوهش از طریق مقیاس استرس ادراک شده کوهن و پرسشنامه پذیرش درد مزمن مک کراکن، ولوز و ایکلستون (2004) جمع آوری و با استفاده از روش رگرسیون چندگانه تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که استرس ادراک شده، به شکل منفی و معنادار توانایی پیش بینی پذیرش درد را دارند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج، استرس ادراک شده، عامل مهم در پذیرش درد بیماران مبتلا به بیماری آرتریت روماتوئید محسوب می شوند و می توانیم از آنها در جهت کنترل درد این بیماران و بهبود کیفیت زندگی شان استفاده کنیم.

کلمات کلیدی:

آرتریت روماتوئید، استرس ادراک شده، پذیرش درد

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/770145>

