

عنوان مقاله:

بررسی میزان شیوع آلودگی انگلی سیستمی سرکوس گوسفند کشتاری در کشتارگاه های صنعتی استان قم در فصول مختلف سال های 1394 تا 1394

محل انتشار:

دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران (سال: 1397)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

نویسندگان:

مهسا فتح آبادی - دانشجوی دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران

مهدی مهدوی نکو - عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران

مرضیه کفایت - استادیار، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران

سارا کریمی - دانشجوی دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران

خلاصه مقاله:

بیماری های انگلی در نشخوارکنندگان حایز اهمیت فراوانی بوده و در این میان کرم های پهن از جایگاه ویژه ای برخوردارند، چرا که می توانند در طول زمان موجب خسارات اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم زیادی شوند. به این منظور، تعداد 1521130 راس گوسفند کشتار شده در کشتارگاه استان قم در مدت 5 سال مورد بازرسی قرار گرفت. براساس یافته های این مطالعه، میزان شیوع آلودگی انگلی سیستمی سرکوس کبدی به طور میانگین به تفکیک فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان در کل دام ها به ترتیب 0/029، 0/021، 0/035 و 0/042 درصد است. با توجه به نتایج این مطالعه میزان بیش ترین و کم ترین شیوع این انگل به ترتیب در فصول زمستان و بهار است که به نوعی با افزایش میزان رطوبت و بارندگی می تواند نسبت داشته باشد. هدف از این مطالعه، بررسی میزان شیوع آلودگی انگلی سیستمی سرکوس در فصول مختلف کشتارگاه های سطح استان قم است تا آمار مناسبی به منظور اطلاع از میزان شیوع این نوع انگل در فصول مختلف سال در جهت اقدامات پیش گیری کننده از انتقال این آلودگی ها و درمان این عوامل در اختیار سازمان های مرتبط قرار گیرد.

کلمات کلیدی:

بیماری انگلی، سیستمی سرکوس، گوسفند، کشتارگاه

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/779885>

