

عنوان مقاله:

اپیدمیولوژی سرطان معده در ایران

محل انتشار:

یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور (سال: 1397)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

نویسندگان:

فریبا دهقانی زاده - دانشجو، رشته پزشکی مقطع دکتری عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

رستم رضاییان - موسسه آموزش عالی میزان، تبریز، ایران

جلال محمدی خوشرج - موسسه آموزش عالی ربع رشید، تبریز، ایران

مطهره نوعی - دانشگاه پردیس بین الملل گیلان، رشت، ایران

خلاصه مقاله:

زمینه و هدف: سرطان معده چهارمین سرطان شایع و دومین سرطان عامل مرگ در جهان است. مرگ و میر ناشی از سرطان معده در ایران و سایر کشورهای آسیایی در حال افزایش است. در مناطق مختلف ایران میزان بروز سرطان معده متفاوت می باشد و بیشترین آمار بروز این سرطان در قسمت شمال و شمال غرب ایران گزارش شده است. علت تفاوت در بروز این بیماری در مناطق مختلف جغرافیایی ناشی از عواملی چون ژنتیک و رژیم غذایی می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه، مروری بر مقالات در مورد اپیدمیولوژی سرطان معده در ایران می باشد که در اینترنت و مجلات معتبر علمی جستجو شده است. با استفاده از کلید واژه های سرطان معده، اپیدمیولوژی، gastric cancer، بروز، عفونت هلیکوباکتریلوری از پایگاه های علمی ایرانداک (irandoc)، سیویلیکا (civilica)، علم نت (pubmed)، magiran، iranmedex، elmnet و Scupos مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج: نتایج نشان دادند که بروز سرطان معده در ایران روند رو به افزایشی را در پیش گرفته است. عوامل اتیولوژیک سرطان معده هنوز به طور کامل شناسایی نشده است اما سن، جنس، منطقه جغرافیایی، رژیم غذایی، ژنتیک، گروه خونی و عفونت هلیکوباکتریلوری می توانند در بروز متفاوت این بیماری در مناطق مختلف ایران دخیل باشند. در ایران ابتلای به این عفونت شایع است. نتیجه گیری: نتایج نشان داده است که بروز سرطان معده با افزایش سن رابطه مستقیم دارد و در سنین بالاتر احتمال بروز آن افزایش می یابد. در حال حاضر بروز آن در مردان بیشتر است اما میزان بروز در زنان در سال های اخیر افزایش بسیاری داشته است. در نهایت می توان چنین استنتاج کرد که بروز سرطان معده در بخش های شمالی و شمال غرب و غرب کشور در حال افزایش است و باید در این مناطق مطالعات گسترده تری به منظور شناسایی علت این بیماری انجام گیرد. همچنین با توجه به نتایج حاصل از سایر تحقیقات، برنامه کنترل عفونت هلیکوباکتریلوری در این مناطق پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی:

سرطان معده، اپیدمیولوژی، gastric cancer، بروز، عفونت هلیکوباکتریلوری

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/801959>



