

عنوان مقاله:

شیوع افسردگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS): یک مطالعه مروری

محل انتشار:

یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور (سال: 1397)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

نویسندگان:

فریدین حیدری - دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری-مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

اتابک حاتمی کیا - دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری-مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

حامد نورالهی - دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری-مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

راضیه شیرزادگان - کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی، مربی بالینی، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری-مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

خلاصه مقاله:

سابقه و هدف : مولتیپل اسکلروزیس (یا ام اس) اختلال مزمن نسبتا شایع عصبی است که طی سالیان اخیر شیوع این بیماری روند رو به رشدی به خود گرفته است. افسردگی از شایع ترین علایم بیماری ام اس محسوب می شود که کاهش کیفیت زندگی را به دنبال دارد. لذا مطالعه ی حاضر با هدف بررسی شیوع افسردگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام شده است. روش جستجو : مرور متون از طریق جستجو در پایگاه های اطلاعاتی Science, Iran medex, SID, 4111 Scopus, Google Scholar, Direct انجام - با کلید واژه های افسردگی، شیوع، فراوانی، مولتیپل اسکلروزیس در بازه ی زمانی 2000-2018 انجام گردید. متن کامل مقالات مرتبط با مطالعات براساس معیارهای ورود (دسترسی به متن کامل مقالات، مرتبط بودن خلاصه مقالات با موضوع تحقیق ، تاریخ انتشار مقالات از 2000-2018) و خروج (عدم دسترسی به متن کامل مقالات) توسط دو محقق به طور مستقل بررسی و از بین 60 مقاله، تعداد 30 مقاله پس از ارزیابی کیفیت انتخاب و در مطالعه ی حاضر از آنها استفاده گردید. یافته ها : انواع افسردگی از علایم شایع بیماری ام اس است. این مشکل روانشناختی (افسردگی) در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شیوع بالایی نسبت به جمعیت عادی دارا است به طوری که بیش از نیمی از مبتلایان از افسردگی خفیف یا شدید رنج می برند و 20 درصد جمعیت کل مبتلایان اکثر اوقات افسرده و درجاتی از آن را تجربه می کنند. نتیجه گیری : بین افسردگی و بیماری ام اس رابطه ای تنگاتنگ برقرار بوده و هرکدام دیگری را تشدید می نماید. ازسویی این دو در مواردی علایم هم را تقلید می نمایند. به این سبب مشخص نیست که دقیقا این علایم منشا گرفته از خود بیماری بوده یا متعاقب افسردگی رخ داده است. در این راستا و مطابق آنچه که بیان شد، لزوم شناسایی و درمان اختلال شناختی در بیماران مبتلا به ام اس ضروری می نماید و گامی مهم در انتخاب مناسب ترین راهکار درمانی برای مبتلایان است.

کلمات کلیدی:

افسردگی، شیوع، فراوانی، مولتیپل اسکلروزیس

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/801995>



