

عنوان مقاله:

تاثیر تغییر وضعیت بیماران بر کمردرد بعد از آنژیوگرافی قلبی

محل انتشار:

فصلنامه پرستاری قلب و عروق، دوره 6، شماره 2 (سال: 1396)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

نویسندگان:

معصومه قیقای - کارشناس پرستاری، سوپروایزر بالینی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان، کاشان، ایران

افسانه کجایی بیدگلی - دانشجوی دکترای سالمندشناسی، دفتر آموزش پرستاری، مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان، کاشان، ایران

حسن رجبی مقدم - فلوشیپ فوق تخصصی آنژیوگرافی، بخش قلب بیمارستان شهید بهشتی کاشان، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

محمدصادق پور عباسی - جراح قلب و عروق، بخش قلب بیمارستان شهید بهشتی کاشان، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

خلاصه مقاله:

هدف. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر تغییر وضعیت بر کمردرد بعد از آنژیوگرافی قلبی انجام شد. ×زمینه. طولانی بودن زمان استراحت در تخت سبب افزایش شکایت بیماران از کمردرد متعاقب آنژیوگرافی میشود. روش کار. مطالعه حاضر یک مطالعه نیمه تجربی بود که بر روی 98 بیماری که جهت انجام آنژیوگرافی عروق کرونر در سال 1393 به بیمارستان شهید بهشتی کاشان مراجعه کرده بودند، انجام شد. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. در این مطالعه، فرم جمع آوری داده ها از سه بخش مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک، مقیاس عددی درد و چک لیست کنترل خونریزی و هماتوم تشکیل شده بود. بیماران گروه کنترل مراقبت معمول بعد از آنژیوگرافی شامل استراحت در تخت به مدت 6 ساعت همراه با بی حرکت نگه داشتن اندام مبتلا را دریافت کردند، اما وضعیت بیماران گروه آزمون بر روی تخت در طی 6 ساعت اول پس از آنژیوگرافی به صورت متناوب تغییر داده شد. بیماران در دو گروه آزمون و کنترل از نظر شدت درد، بروز خونریزی و تشکیل هماتوم، بلافاصله بعد از انتقال به تخت بخش بستری، و سپس دو، چهار و شش ساعت بعد از آنژیوگرافی بررسی شدند. داده های مطالعه با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS نسخه 11.5 تحلیل شدند. ×یافته ها. بر اساس نتایج، تفاوت معنی داری میان میانگین شدت کمردرد بیماران گروه آزمون و کنترل پس از انتقال به بخش (4)، $p=0/004$ ساعت ($p\geq 0/0001$) و 6 ساعت ($p\geq 0/0001$) پس از آنژیوگرافی وجود داشت. × نتیجه گیری. در این مطالعه تغییر وضعیت بیماران پس از آنژیوگرافی بدون ایجاد عوارضی همچون هماتوم و خونریزی باعث کاهش بروز کمردرد در بیماران شد. لذا میتوان گفت این مداخله میتواند به عنوان یک روش مطلوب برای کاهش شدت کمردرد در بیماران پس از آنژیوگرافی اجرا شود.

کلمات کلیدی:

آنژیوگرافی عروق کرونری، تغییر وضعیت، هماتوم، خونریزی، کمردرد

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/809054>

