

عنوان مقاله:

تاثیر عملکرد پرستار رابط بر میزان بروز عوارض عفونی ناشی از سکتة مغزی پس از ترخیص از بیمارستان: یک کارآزمایی بالینی

محل انتشار:

نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور (سال: 1397)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

نویسندگان:

صدیقه ابراهیمی - دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

زهره کلانی - عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

خلاصه مقاله:

سابقه و هدف: سکتة مغزی دومین عامل مرگ و میر در جهان و سومین عامل رایج ناتوانی های بلند مدت و جدی در بزرگسالان است. باوجود پیشگیری و تشخیص سریع و مدیریت عوارض در سکتة مغزی، بیماران همچنان در معرض خطر بالای عوارض عفونی(عفونت ادراری و پنومونی) ناشی از این وضعیت هستند. پرستاران رابط متخصصانی هستند که با بررسی دقیق و همه جانبه و استفاده از مهارت های ارتباطی و تکنیکی به مراقبت بیماران پیچیده دارای مشکل فراوان مثل بیماران سکتة مغزی کمک می کنند. پرستار رابط در بیماران سکتة مغزی وظیفه بهبود برنامه ترخیص و ادامه روند درمان در این بیماران را به عهده دارد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر عملکرد پرستار رابط بر پیامد بیماران سکتة مغزی پس از ترخیص از بیمارستان طراحی و اجرا شده است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی است. تعداد 80 بیمار با روش نمونه گیری در دسترس مبتنی بر هدف انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. بیماران گروه آزمون قبل از ترخیص توسط پرستار رابط مورد ارزیابی قرار گرفته و برنامه مراقبتی و آموزشی با تمرکز بر نیازهای هر بیمار تدوین و هنگام ترخیص کتابچه آموزشی جهت جلوگیری از عوارض به بیمار و یا مراقبین وی تحویل داده شد. در صورت لزوم پرستار رابط بر بالین بیمار در منزل حاضر می شد و جهت برطرف کردن مشکلات بیمار با بیماران در تماس بود. گروه کنترل مراقبت روتین بخش دریافت و مرخص شدند. دو هفته و دوماه بعد از ترخیص، بیماران دو گروه از جهت بروز عوارض شامل پنومونی، عفونت ادراری پایش گردیدند. یافته ها: در این مطالعه 80 بیمار (35 بیمار گروه آزمون و 45 بیمار گروه کنترل) مورد بررسی قرار گرفتند. دو گروه از نظر میانگین سنی، توزیع بیماران از نظر جنس، داشتن سند بینی-معدة ای و سوند ادراری، یکسان بودند. میزان بروز پنومونی ($p=0/356$) در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت. در میزان بروز عفونت ادراری ($p=0/001$) تفاوت معنی داری مشاهده شد. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که عملکرد پرستار رابط سکتة مغزی که هر بیمار را جداگانه با توجه به وضعیتش ارزیابی می کند و برنامه مراقبتی در منزل را جداگانه برای هر بیمار تدوین و پیگیری می کند، فراتر از آموزش کلی که به این بیماران داده می شود، در کاهش عوارض این بیماری می تواند موثر باشد.

کلمات کلیدی:

سکتة مغزی، پرستار رابط، عوارض بعد از سکتة مغزی، پنومونی، عفونت ادراری

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/809914>

