

عنوان مقاله:

بررسی توزیع فراوانی علل کلینیکو پاتولوژیکال هیستریکتومی در بیمارستان شهید صدوقی یزد از سال 1390-1394

محل انتشار:

نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور (سال: 1397)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

نویسندگان:

محمد شفیعی - دانشجو پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، ایران.

شکوه تقی پور - متخصص و استاد پاتولوژی، گروه پاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران.

مطهره بیکی - دانشجو پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، ایران.

زهره شجاعی - دانشجو پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، ایران.

خلاصه مقاله:

سابقه و هدف: هیستریکتومی یکی از اعمال شایع در زنان است. با توجه به اینکه عمل هیستریکتومی منجر ناباروری وی پس عمل، اثرات گسترده بر زندگی خود فرد و خانواده وی می شود و همچنین عدم اطلاع از شیوع و علل هیستریکتومی در شهر یزد، در این مطالعه به بررسی و تعیین شیوع و علل منجر به هیستریکتومی پرداخته می شود. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی گذشته نگر می باشد، که بر روی 1395 نفر از بیمارانی که از سال 90 الی 94 در بیمارستان شهید صدوقی تحت عمل هیستریکتومی قرار گرفته و دارای گزارش پاتولوژی می باشند، انجام شد. روش اخذ اطلاعات از طریق تکمیل پرسشنامه های از پیش تنظیم شده ای است که با مراجعه به پرونده های موجود در بیمارستان شهید صدوقی صورت می گیرد. پس از استخراج اطلاعات، داده ها در نرم افزار SPSS ورژن 19 وارد می شود و نتایج به صورت جدول فراوانی یک بعدی و دوبعدی و نمودارهای آماری استخراج می گردد. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که میانگین سنی بیماران مورد مطالعه $51/53 \pm 10/21$ بوده است. همچنین نتایج نشان داد که شایع ترین سال هیستریکتومی، سال 1394 (28%)، شایع ترین علت هیستریکتومی، AUB (70.8%)، شایع ترین نوع هیستریکتومی، ترانس ایدومینال (41.5%)، شایع ترین پاتولوژی سرویکس، التهاب (72.5%)، شایع ترین پاتولوژی رحم، آدنومیوز (45.8%) و شایع ترین پاتولوژی تخمدان، بدون برداشتن تخمدان (47.1%) بوده است. همچنین یافته ها نشان داد که بین میانگین سن بیماران و هیچ کدام از متغیرهای مطالعه رابطه آماری معناداری وجود ندارد ($P > 0/05$). نتیجه گیری: خونریزی های غیر طبیعی رحم شایع ترین علت و ترانس ایدومینال هیستریکتومی شایع ترین نوع هیستریکتومی در زنان است. انجام مطالعه تکمیلی جهت بررسی دقیق بیماران قبل از عمل، شناخت اندیکاسیون های هیستریکتومی و روش های نوین درمان طبی و جراحی جهت اداره صحیح بیماران و جلوگیری از انجام هیستریکتومی نابجا ضروری به نظر می رسد.

کلمات کلیدی:

هیستریکتومی، علل کلینیک و پاتولوژیکال، توزیع فراوانی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/810082>

