

عنوان مقاله:

بررسی تطبیقی نتایج CBE، ماموگرافی و سونوگرافی در زنان دارای درد پستان مراجعه کننده به بیمارستان بهبود تبریز

محل انتشار:

فصلنامه بیماری های پستان، دوره 5، شماره 1 (سال: 1391)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

نویسندگان:

سمیه نقی زاده - کارشناس ارشد مامایی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.

پروین محبی - کارشناس ارشد مامایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان.

پروین هادی زاده - کارشناس مامایی، بیمارستان بهبود تبریز

خلاصه مقاله:

درد پستان یکی از علایم بالینی شایع و مهم ضایعات پستانی خوشخیم و بدخیم می باشد، و علاوه بر ترس ناشی از سرطان که موجب مراجعات و انجام بررسی های پزشکی مکرر میشود، باعث اختلال در فعالیتهای اجتماعی، شغلی و خانوادگی میشود. هدف مطالعه حاضر بررسی تطبیقی نتایج CBE2، ماموگرافی و سونوگرافی در زنان دارای درد پستان مراجعه کننده به بیمارستان بهبود تبریز میباشد. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی بر روی 572 بیمار که با شکایت درد پستان که در طی یک دوره یکساله به بیمارستان بهبود تبریز مراجعه کرده بودند انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای شامل مشخصات فردی- اجتماعی و مامایی، اطلاعات بدست آمده از معاینه بالینی پستان، ماموگرافی، سونوگرافی و پاتولوژی بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمونهای آماری کایدو و مک-نمار در نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: 56/8% افراد درد هر دو پستان، 28/3% درد پستان چپ و 14/9% درد پستان راست داشتند. معاینات کلینیکی پستانها نشان داد که در پستان چپ و راست به ترتیب 32% و 25/7% دارای قوام غیرطبیعی و 37/1% و 29% دارای توده در پستان بودند. در بررسی نتایج ماموگرافی و سونوگرافی به ترتیب، 55/4% و 77/8% یافته طبیعی، 13/9% و 12/3% توده و در 30/7% و 9/9% ضایعات خوشخیم گزارش شد. بر روی (8/6) 49 نمونه، بررسی پاتولوژی انجام گرفت. و 8/2% یافته طبیعی، 49% کانسر پستان و 42/8% ضایعات خوشخیم گزارش شد. بین نتایج CBE و ماموگرافی، CBE و سونوگرافی و نتایج پاتولوژی و ماموگرافی ارتباط آماری معنیداری وجود داشت اما بین پاتولوژی و سونوگرافی ارتباط آماری معنیداری وجود نداشت. نتیجه گیری: استفاده از تصویربرداری در کنار معاینات بالینی دقیق، به عنوان یک اقدام موثر در افراد مراجعه کننده با درد پستان توصیه میگردد. منفی بودن نتایج سونوگرافی و ماموگرافی در این افراد اطمینان بخش تلقی میشود و در صورتیکه معاینه بالینی نیز نرمال باشد صرفا پیگیری بیماران توصیه میگردد.

کلمات کلیدی:

CBE، ماموگرافی و سونوگرافی، درد پستان.

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/833067>

