

عنوان مقاله:

استفاده از کوکسیدو استات ها بروز کوکسیدوزیز در گله های گوشتی شهرستان آمل

محل انتشار:

شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران (سال: 1389)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

نویسندگان:

محمدرضا سپهری - دانشجوی سال آخر دامپزشکی

حمید حبیبی - دانشجوی سال آخر دامپزشکی

سیدستار جلالی - دانشجوی سال آخر دامپزشکی

مسعود داوری - دانشجوی سال آخر دامپزشکی

خلاصه مقاله:

کوکسیدوز یک بیماری تک یاخته ای آیمریا می باشد که زیانهای اقتصادی مشکلات گوارشی را به دنبال دارد به تبع آن افزایش ضریب تبدیل کاهش رشد عقب افتادگی گله را به دنبال دارد در مناطق مرطوب این بیماری بیشتر نمود دارد باید در کنترل آن بیشتر دقت به عمل آورد در این مطالعه از 45 مرغداری در شهرستان آمل در سال 1388 نمونه گیری به عمل آمده به روش معمولی (OPG) اوسیت در یک گرم مورد بررسی قرار گرفت طی این تحقیق در 36 مورد از گله ها در گیری دیده نشده بود تنها در 9 مورد درگیری دیده شد از این بین مورد جیره فاقد کوکسیدو استات مورد جیره حاوی کوکسیدو استات را داشتند در مناطق مرطوب حتما از کوکسیدو استات ها استفاده کرده در استفاده از آن باید دقت کرد که بر اساس برنامه پیشنهادی از دارو استفاده کرده برنامه های متفاوتی را در طول دوره یا بین دوره با دارو های متفاوت اجرا کنند همچنین در هنگام مخلوط کردن دان به نحوه مخلوط کردن بسیار دقت شود

کلمات کلیدی:

کوکسیدو استات، آمل

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/840195>

