

عنوان مقاله:

بررسی میزان کبد ریه ضبیطی مبتلا به کیست هیداتیک در میان گاو وگوساله کشتار شده درکشتارگاه صنعتی شهرستان سلماس

محل انتشار:

شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران (سال: 1389)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

نویسندگان:

کسری راستگویی - دانشگاه آزاد ارومیه

امین رضازاده - دانشگاه آزاد ارومیه

وحید قیاسی - دانشگاه آزاد ارومیه

خلاصه مقاله:

هیداتیدوز بیماری انگلی مشترک بین انسان دام به صورت چند میزبان می باشد. این بیماری بر اثر ابتلاء به مرحله لاروی گونه های مختلف انگل اکینوکوکوس در انسان حیوانات علفخوار ایجاد میشود که از بیماری های مشترک خطرناک نسبتا شایع بین انسان دام در پاره ای از مناطق جغرافیایی جهان به شمار می رود که باعث خسارتهای اقتصادی بهداشتی می شود. انتشار جهانی این بیماری از آن جهت مورد توجه است که تنوع میزبان های واسط و نهایی اهلی وحشی این انگل از قطب شمال تا نزدیک قطب جنوب کشیده شده است. گونه بالغ این انگل در روده باریک سگ سانان سایر گوشتخواران یافت می شود، که به عنوان میزبان نهایی گونه نابالغ آن در بسیاری از پستانداران به ویژه علفخواران دیده می شود که به عنوان میزبان واسط مطرح اند. نقش میزبان واسط (انسان علفخواران) در بخشی از چرخه این بیماری حیطة عمل آن را وسیعتر و شاید کنترل آن را مشکلتر کرده است. طی بررسی انجام شده که از ابتدای فروردین 87 تا ابتدای فروردین 88 انجام گرفت، تعداد 5627 گاو وگوساله در کشتارگاه، کشتار شد. از این تعداد لاشه کبد 268 راس و ریه 349 راس ضبط شد که کلا 10/9 درصد لاشه ها را تشکیل می دهد. آمار به دست آمده از فصول مختلف نشان می دهد که میزان آلودگی در فصل زمستان کمتر از سایر فصول می باشد و در سایر فصول آلودگی تقریبا یکسان است نیز میزان ابتلا در ریه بیشتر از کبد می باشد.

کلمات کلیدی:

هیداتیدوز-بیماری زایی-آمار مبتلایان در گاو وگوسفند-ارگانهای درگیر-سلماس

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/840818>

