

عنوان مقاله:

بررسی میزان شیوع انگل های سیستم قلبی عروقی سیستم ادراری تناسلی در سگهای ولگرد ارومیه

محل انتشار:

شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران (سال: 1389)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

نویسندگان:

عبدالرحمان خضری - دانشجوی سال ششم دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه،

موسی توسلی - بخش انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

شهرام جوادی - بخش علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

اسماعیل برتافته - دانشجوی سال ششم دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه،

خلاصه مقاله:

دو گونه دایروفیلاریا ایمیتیس دایروفیلاریا ریپنس هر دو به عنوان انگل های مشترک انسان دام شناخته شده اند دایروفیلاریا ایمیتیس بیشتر در دهلیز سمت راست، سرخرگ ششی ورید میانخالی خلفی گوشتخواران دایروفیلاریا ریپنس در بافت همبند زیر جلدی گوشتخواران بخصوص سگ زندگی می کنند. دیکتوفیما رناله، مشهور به کرم غول پیکر کلیه نیز می تواند انسان را به صورت اتفاقی آلوده کند، این کرم عمدتاً در لگنچه کلیه سمت راست دیده میشود. با توجه به اهمیت زیونوتیک این آلودگی ها سعی گردید وضعیت آلودگی سگهای ولگرد ارومیه به این سه مورد بررسی قرار گیرد. در این مطالعه بعد از هماهنگی های بعمل آمده تعداد 20 قلاده سگ در سطح شهر با استفاده از تفنگ شکاری، شکار پس از انتقال به دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه کالبدشکافی گردیدند، از این تعداد هیچ موردی آلوده به دایروفیلاریا ریپنس دیکتوفیما رناله یافت نشد تنها در قلاده سگ (10%) سگها) دایروفیلاریا ایمیتیس در قلب مشاهده گردید که هر دو این کرم ها ماده بودند، یکی از سگها 4 ساله نر، دیگری 4 ساله ماده بود. با توجه به نتایج بدست آمده قابل انتقال بودن این انگل ها پیشنهاد میگردد که سطح بهداشت عمومی بهبود یابد سعی در کنترل حیوان های ولگرد شود

کلمات کلیدی:

دایروفیلاریا ایمیتیس، دایروفیلاریا ریپنس، دیکتوفیما رناله، سگ ولگرد

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/840843>

