

## عنوان مقاله:

مقایسه اضطراب افسردگی در بیماران تحت درمان نگر دارنده با متادون با بیماران تحت درمان نگر دارنده با بوپرونورفین در مراکز ترک اعتیاد شهرجیرفت

## محل انتشار:

دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره، تعلیم و تربیت (سال: 1397)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

## نویسندگان:

فاطمه سالاری مقدم - دانشجوی کارشناس ارشد بالینی دانشگاه آزاد واحد اسلامی انار

علی مهدی زاده - مدرس دانشگاه آزاد واحد اسلامی انار

## خلاصه مقاله:

تحقیق حاضر به مقایسه اضطراب افسردگی در بیماران تحت درمان نگر دارنده با متادون با بیماران تحت درمان نگر دارنده با بوپرونورفین در مراکز ترک اعتیاد شهرجیرفت پرداخته است جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بیماران تحت درمان با متادون بوپرونورفین در مراکز ترک اعتیاد شهرجیرفت بودند که 50 نفر از هرگروه به روش نمونه گیری همتاسازی با بیماران بوپرونورفین انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه اضطراب بک (1988) پرسشنامه افسردگی بک (1961) استفاده شد. نتایج نشان داد بین اضطراب در دو گروه بیماران تحت درمان نگر دارنده با متادون و بیماران تحت درمان نگر دارنده با بوپرونورفین تفاوت معناداری وجود ندارد بین افسردگی در دو گروه بیماران تحت درمان نگر دارنده با متادون بیماران تحت درمان نگر دارنده با بوپرونورفین تفاوت معناداری وجود دارد. هر دو گروه بیماران اضطراب را تجربه می کردند، اما بیماران تحت درمان متادون افسردگی را داشتند درمقابل بیماران تحت درمان بوپرونورفین افسردگی نداشتند. در نتیجه می توان گفت بیماران تحت درمان با بوپرونورفین نسبت به تحت درمان با متادون اختلالات خلقی کمتری داشتند

## کلمات کلیدی:

اضطراب، افسردگی، بیماران تحت درمان نگر دارنده متادون بوپرونورفین

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/843094>

